

Taxon Chaenomeles speciosa ‘Cardinalis’

Název taxonu	Chaenomeles speciosa ‘Cardinalis’
Vědecký název taxonu	Chaenomeles speciosa
Jména autorů, kteří taxon p...	(Sweet) Nakai
Odrůda	‘Cardinalis’
Český název	kdoulovec lahvicovitý
Synonyma (zahradnický pou..	Chaenomeles lagenaria, Chaenomeles japonica,
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Chaenomeles

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: Šlechtitel - p. Moerloose, 1855 v Belgii

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	větve rozkladité, vzrůst široký a nízký a nepříliš atraktivní, výška do 2 m
Výhony	lysé, tmité
Pupeny	vstřícné
Listy	listy podlouhle vejčité, eliptické nebo oválné, vzácně dlouze eliptické, tupé nebo špičaté, ostře pilovité, lesklé, 3–9 cm dlouhé, palisty téměř okrouhlé, 10–15 mm, opadavé
Květenství	květy jednotlivě nebo po několika
Květy	výrazně tmavě šarlatové, 3–5 cm široké, sepaly téměř okrouhlé, 3–4 mm, petaly vejčité až téměř okrouhlé, jednoduché až poněkud plné
Plody	malvice, jablkovitá, 3 - 7 (15) cm dlouhá, žlutá až žlutozelená, často poněkud načervenalá, vonná
Semena	ve zralosti tmavě hnědá
Kůra a borka	hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	Zóna 5 (- 29 °C)
Faktor vody	nenáročná, snese suché půdy
Faktor půdy	na půdy nenáročný, nevysazovat do půd s vyšším pH (chloróza), snáší městské prostředí

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	dobře snáší řez - vhodný k tvarování, jinak řez nevyžaduje, řez se provádí v zimě (méně kvete), nebo lépe v červnu
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období v květu
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny, živé ploty, tvarování

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka	Nejpoužívanějším způsobem je bylinné řízkování, méně častým způsobem roubování kultivarů na původní druh, Crataegus nebo na Sorbus

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem (Matečnice - 10. řada)
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Odkazy	• www.databaze.dendrologie.cz, • http://www.openbaargroen.be • , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,