

Taxon *Spiraea japonica* 'Gold Flame'

Název taxonu	<i>Spiraea japonica</i> 'Gold Flame'
Vědecký název taxonu	<i>Spiraea japonica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Burv.
Odrůda	'Goldflame'
Český název	tavolník japonský
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Spiraea japonica</i> 'Bumalda'
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Rosaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	<i>S. x bumalda</i> je kříženec nejistého původu, nejčastěji jsou uváděny rodičovské druhy <i>S. albiflora</i> x <i>S. japonica</i> . <i>Spiraea x bumalda</i> je velice podobná druhu <i>S. japonica</i> od kterého se velmi obtížně rozeznává a tak jsou často odrůdy tohoto původu řazeny jednotně pod druh <i>S. japonica</i> . Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1960 (Shum 's Nursery).

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Nízký, hustě rozvětvený keř, roční přírůstek je 10 až 20 cm, keř dosahuje v 10 letech výšky 0,7-0,9 m, šířky 0,8 -1,0 m
Výhony	letorosty rýhované, v mládí chlupaté, výrazně žlutooranžové
Pupeny	vstřícné
Listy	opadavé, vejčitě kopinaté (3-7 cm), 2x ostře pilovité, výrazně žlutooranžové
Květenství	v chocholičnatých, 6-12 cm širokých, plochých latách
Květy	karmínově růžové, nálevkovitě zvonkovité
Plody	měchýřky pukající břišním švem, téměř lysé
Semena	podlouhlá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	ve stínu málo kvete a keře jsou řidké
Faktor tepla	Zóna 5 (- 29 °C)
Faktor vody	vyhovují jí vlhčí půdy, ne zamokřené, nesnáší sucho
Faktor půdy	nenáročná, roste v běžné zahradní půdě, pH slabě kyselé až slabě alkalické

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	rostliny je vhodné na jaře zkrátit přibližně na polovinu, tím zajistíme hustý polštářovitý růst a bohaté kvetení
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období v květu
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny, plošné zahuštěné výsadby jako půdní pokryv, vhodný pro nízké volně rostoucí i stříhané živé plůtky a obruby, do skalek a pro osázení mobilních nádob

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	nejpoužívanější způsob je množení bylinnými řízky odebíranými v období června, dále je možné kultivar velmi dobře množit z dřevitých řízků

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)

- <http://www.rhs.org.uk/getattachment/28274bc8-5859-4e5d-9979-e31252b6d4c7/Spiraea-japonica-with-coloured-leaves-Bulletin.aspx>