

Taxon Vitis vinifera Merlot

Název taxonu	Vitis vinifera Merlot
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Merlot´ (Me)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Merlot noir, Medoc noir, Merlau
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o strobylou francouzskou odrůdu, vznikla spontánním křížením odrůd ´Magdeleine Noire des Charentes´ a ´Cabernet Franc´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, široké, tupé
Listy	velké, pětilaločnaté, hluboce vykrajované, bazální výkroj je otevřený; povrch listu je tmavě zelený, spodní strana listu je jemně plstnatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý hrozen, křídlatý, středně hustý až řidší; bobule je malá, kulatá, modročerné barvy
Semena	středně velká, hruškovitá, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	snáší i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažen
Podnož	dle půdního typu, upřednostňujeme podnože omezující růst jako Amos či T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	citlivější k houbovým chorobám i mrazu
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8 - 12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má tmavě rubínovou barvu, specifickou ovocnou odrůdovou chuť po černých třešních až ostružinách
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, rosé, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 114\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

