

Taxon Vitis vinifera Noria

Název taxonu	Vitis vinifera Noria
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Noria’ (No)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	RRxSE 23/33
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Ryzlink rýnský’ x ‘Semillon’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je slabší až středně silné, šedohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, okrouhlé, pětilaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je tvaru písmene V, otevřený; povrch listu je tmavě zelený, vrásčitý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký, válcovitě-kuželovitý, středně hustý hrozen, na kratší stopce; bobule kulatá až lehce oválná, středně velká, zelenožlutá
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Ryzlink rýnský’ (No má zelenější bobule a naopak chybí černá tečka po blizně)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý taž, snáší i krátký řez
Podnož	SO 4, CR 2 i Kober 125 AA, dle vedení a půdních podmínek

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, láká obaleče
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	vůně vína je ovocná, jemně kořenitá; v chuti připomíná odrůdu Semillon, cítit můžeme angrešt a citrusové plody
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 113)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

