

Taxon Muscari latifolium

Název taxonu	Muscari lat ifolium
Vědecký název taxonu	Muscari lat ifolium
Jména autorů, kteří taxon p...	J.Kirk.
Český název	modřenec širolistý
Synonyma (zahradnický pou..	syn. Bellevalia muscarioides Mast.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Muscari

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Turecko. Evropy přivezen v roce 1858 ze severozápadního Turecka, kde roste ve světlých borovicových lesích, v okrajových porostech stromů, vyskytuje se zde také v podrostech keřů, ale i na otevřených stráních.

Zařazení

Pěst itelská skupina	Cibulnat á rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Z cibule raší pouze jeden nebo dva široce kopinaté listy a 20 - 30 cm vysokých květní stonek. Hroznovit é květenství je složeno ze světle modrých sterilních kvítků na vrcholu a tmavě fialových fert ilních kvítků.

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Kořeny jsou svazčité
Pupeny	Pupeny jsou umístěny na podpučí cibule
Listy	Široce kopinaté, 1 až 3 cm široké, z jedné cibule vyrůst á jeden list nebo maximálně dva listy
Květenství	Hrozen, květenství má na vrcholu květy sterilní a pod nimi se vyskytují listy fert ilní (plodné).
Květy	Jednotlivé květy soudečkovitého tvaru. Na vrcholu květenství je asi 10 květů sterilních, které mají světle modrou barvu a po nimi jsou květy fert ilní, které mají modrofialovou barvu.
Plody	Plodem je třípouzdrá tobolka.
Semena	Semena černá drobná.

Možnost záměny taxonu (+..	Není podobný žádnému jinému modřenci.
Vytrvalost	V příznivých podmínkách je dobře vytrvalý. Na plném slunci a v suchu je krátkověký.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka	Rašení je závislé od aktuálního počasí v daném roce, a proto se doba může lišit, jako u jiných jarních cibulnatých a hlíznatých rostlin.

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	Tobolky se semeny dozrávají koncem května.
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor světla	Ideální pro růst je polostín. Může růst i na plném slunci, ale nesmí mít sucho.
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor půdy	Roste v neutrálních až mírně kyselých půdách.

Užitné vlastnosti

Použití	Díky výrazně modré barvě květů jsou modřence ideální na výsadby do skupin s ostatními na jaře kvetoucími cibulovinami především s narcisy a žlutě a oranžově kvetoucími tulipány. Je možné z nich vysadit i obruby záhonů, kombinovat je s trvalkami, nechat je zplanět v trávníku i pod skupinami dřevin. Používají se také k výsadbám do nádob a k rychlení nebo přirychlování.
Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.
Doporučený spon pro výsad..	10 x 10 cm

Množení

Množení - poznámka	Množí se dceřinými cibulkami nebo výsevem semen.
--------------------	--

Grafické přílohy

