

Taxon Vitis vinifera Svatovavrinecke

Název taxonu	Vitis vinifera Svatovavrinecke
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Svatovavřínecké’ (Sv)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Saint Laurent, Pinot St. Laurent, Lorenztraube
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původ je nejasný, pravděpodobně vznikla ve francouzském regionu Alsasko, spontánním křížením odrůdy Pinot Noir

Zařazení

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	střední růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavohnědé
Pupeny	velké, široké, tupé
Listy	středně velké, mělce tří až pětilaločné, bazální výkroj je lyrovitý, většinou úzce otevřený; povrch vrásčitý, tmavě zelený, vespod mírně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je středně velký, kuželovitý, hustý; bobule je středně velká, kulatá, modročerná
Semena	středně velká, kulatá, zobáček je delší
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Rulandské modré (Sv má však větší a tmavší hrozen)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Září

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění

Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost nižší

Faktor vody méně vhodné jsou těžší jílovité půdy

Faktor půdy půdy záhřevné, lehké, štěrkovité, snáší i půdy s vyšším obsahem vápníku

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vysoké i střední vedení

Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez

Podnož pro úrodnější půdy SO 4 a Teleki 5 C, chudší půdy CR 2, Kober 5 BB a LE-K/1

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína

Choroby a škůdci náchylnější k houbovým chorobám, sprchává

Plodnost středně pozdní, méně stabilní (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Odrůdy klony KA - 3/52, KA - 4/8, KA - 4/10, KA - 6/12, PO - 7/5, PO - 10/7

Popis vína víno je tříslovité, mávě červené se svěží ovocnou vůní a plnou chutí připomínající povidla

Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 114\)](#)

Grafické přílohy

