

# Taxon *Pisonia umbellifera*

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Pisonia umbellifera                                                                                     |
| Vědecký název taxonu           | Pisonia umbellifera                                                                                     |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(J.R. Forst. et G. Forst.) Seem (1862)</a>                                                  |
| Český název                    | pisónie                                                                                                 |
| Synonyma (zahradnicky pou..    | Ceodes umbellifera J.R. Forst. & G. Forst.; Calpidia excelsa (Blume) Heimerl; Pisonia brunnoniana Endl. |
| Autor                          | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)                                                                  |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                                                                    |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Pisonia</a>                                                                                 |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Paleotropická květenná říše, Madagaskarská oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast, Malesijská oblast, Novokaledonská oblast, Australská květenná říše, oblast australského severovýchodu, Tasmánská oblast, Holantarktická květenná říše a Novozélandská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Austrálie: Queensland, Nový Jižní Wales, Ostrov Lorda Howe, Norfolk, Nový Zéland; Mauritius; Indonézie, Malajsie, Filipíny                                                                                                                                            |

## Zařazení

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený |
| Životní forma       | Fanerofyt                                                                                  |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | stálezelený široce větvený keř nebo strom, výšky 3-6(-28) m, kulovitého tvaru; v interiérech do 2 m                                                                                                                                                        |
| Výhony     | kmínky vzpřímené, dřevnaté                                                                                                                                                                                                                                 |
| Listy      | listy vstřícné nebo ve zdánlivých přeslenech, eliptické, vejčité nebo (elipticky) podlouhlé, až 40 x 15 cm, báze široce klínovitá, vrcholek zašpičatělý nebo tupý, 8-10 párů žilek, řapíky až 5 cm dlouhé; kožovité a lesklé                               |
| Květenství | terminální latnaté vrcholíky                                                                                                                                                                                                                               |
| Květy      | drobné, zelené nebo růžové až žluté, 5četné; stopky květů 1,5-6 mm, s 1-3 listenci na bázi nebo výše, trubka květu zvonkovitá, 5-7 mm, hnědochlupatá, vrcholek 5laločný, tyčinek 6-14, nitky nestejně dlouhé, prašníky téměř kulovité, semeníky podlouhlé, |

čnělky štíhlé, kvete na jaře

Plody plody téměř cylindrické, trochu zakřivené, 4-5křídle nebo 4-5žebré, lepkavé, hnědé, 20-40 x asi 6 mm velké

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                                                            |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                                            |
| Faktor světla - poznámka | světломilná, na příliš tmavých stanovištích listy ztrácejí své vybarvení                                                     |
| Faktor tepla             | teplý až poloteplý skleník či interiér; teploty v zimě 10-20 °C, optimální 15 °C; citlivě reaguje na podchlazení kořenů      |
| Faktor vody              | rovnoměrná vlhkost substrátu; při chladném přezimování velmi opatrná zálivka; při teplém přezimování zvýšená vlhkost vzduchu |
| Faktor půdy              | humózní, dobře provzdušněná půda s přidavkem zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5                                                   |

## Užité vlastnosti

---

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | leden až prosinec                                                                                      |
| Použití                        | solitérní rostlina, sesazované nádoby                                                                  |
| Choroby a škůdci               | štitěnky, puklice a listové mšice v příliš suchém vzduchu; při vysokých zimních teplotách shazuje list |

## Množení

---

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky |
| Množení - poznámka | na jaře semeny nebo v létě polodřevitými řízky (při teplotě 20-25 °C)                                         |
| Odrůdy             | Variegata' - listy zeleně mramorované, okraj krémově bílý, obzvláště v mládí narůžovělý                       |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/22500321?tab=references>