

Taxon Viburnum lantana

Název taxonu	Viburnum lantana
Vědecký název taxonu	Viburnum lantana
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	kalina tušalaj, tušalaj chlupatý, tušalaj obecný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Viburnum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Kavkaz, Malá Asie, severní Afrika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	opadavý, někdy poloopadavý keř či stromek
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, někdy poloopadavý, široce vejcovitě protáhlý keř, větve vzpřímeněji postavené, větvení řídké, někdy stromek, výška do 5 m
Výhony	letorosty šedoplstnatě hvězdovitě chlupaté
Pupeny	pupeny nahé, plstnaté
Listy	listy (široce) vejčité až podlouhle vejčité nebo eliptické, 4–16 cm dlouhé, špičaté až tupé, báze je mělce srdčitá nebo zaoblená, hustě a jemně zubaté, svrchu svraskalé a tmavě zelené, naspodu hustě šedě hvězdovitě chlupaté až plstnaté, 6–13 párů žilek, řapíky 1–3 cm dlouhé
Květenství	květy v 6–10 cm širokých, terminálních, hvězdovitě chlupatých a kompaktních mnohokvětých vrcholících
Květy	květy téměř přisedlé, žlutavě bílé, 5–9 mm v průměru, vonné
Plody	plody podlouhle vejcovité nebo vejcovitě elipsoidní, 7–10 mm dlouhé, zprvu zelené, pak červené, nakonec černé, lesklé peckovice

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce, mírný stín
Faktor tepla	oblast I-IV (když má dostatečně živné a vápnité půdy, jinak jen III)
Faktor vody	půda středně vlhká, snese i sucho
Faktor půdy	na živiny bohaté půdy, vápnité
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ, později plod
Použití	hlavně v krajině, suché meze a rozptýlené skupiny

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Hřížení
Množení - poznámka	nejčastěji množíme řízkováním, nebo při menší potřebě výsadbového materiálu hřížením
Odrůdy	Aureum' - rašení a mladé listy zlatožluté, později zelené se žlutým nádechem; mladé výhony také zlatožluté, 'Variegatum' - velké opadavé keře asi 4 m vysoké; listy nestejně krémově žlutě pestré