

Taxon Begonia x tuberhybrida

Název taxonu	Begonia x tuberhybrida
Vědecký název taxonu	Begonia x tuberhybrida
Jména autorů, kteří taxon p...	Voss (1894)
Český název	kysala hlíznatá
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. grandiflora
Nadřazená kategorie	Begonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	kříženci výsledkem složité hybridizace druhů rostoucích v Andách - B. boliviensis, B. gracilis, B. parpei, B. veitchii, aj.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá, Trvalka stálezelená, Hlíznatá rostlina, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Kryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatě rostoucí rostliny, vzpřímené nebo převisající; výška 20-40 cm, převislé formy do 60 cm délky
Kořen	miskovité bazální hlízy; období vegetačního klidu v zimě, skladují se v rašelině v chladném prostředí (cca 10 °C)
Výhony	na rostlině 2-3 ztlusté dužnaté výhony, řídce větvené
Listy	střídavé; velké asymetrické, dlouze srdčité, celokrajné nebo zubaté až dlanitě stříhané, tmavě zelené, někdy načervenalé či s bronzovým nádechem, chlupaté
Květenství	vrcholičnaté
Květy	velké, v průměru 7-10 (i více) cm; jednopohlavné a jednodomé; jednoduché (skupina single) až plné; barvy bílé, žluté, růžové, oranžové, červené, tmavočervené, mohou být i dvojbarevné; jednoduché samčí květy mají 2 páry okvětních lístků a sloupek čtýřných tyčinek; plnokvěté samčí květy jsou zcela sterilní
Semena	drobná, velké množství

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlá stanoviště až polostín; chránit před přímým sluncem
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník či interiér; teploty v létě 18-22 °C; přes léto se pěstuje venku na chráněných stanovištích před deštěm a větrem
Faktor vody	mírná vyrovnaná zálivka; v interiéru vyšší vzdušná vlhkost; přes zimu se hlízy přechovávají v chladu (cca 10 °C) a suchu
Faktor půdy	humózní propustný substrát; pH 5,5 - 6,8

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	duben až září
Použití	hlíznaté rostliny pro venkovní výsadby do okenních a balkónových nádob
Choroby a škůdci	kořenová a listová háďátka; mšice a třásněnky; padlí begoniové, virová kroužkovitost begonie, bakteriální skvrnitost

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Řízkování, Kořenové řízky a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	dělení hlíz

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník; truhlíky vně skleníku v Experimentální zahradě)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/3400004?tab=references http://www.biolib.cz/cz/taxon/id61999/
--------	--