

Taxon Vitis vinifera Veltlinske cervene rane

Název taxonu	Vitis vinifera Veltlinske cervene rane
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Veltlínské červené rané’ (VČR)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Frühroter Veltliner, Babotraube, Malvasier, Červený Cinyfál, Večerka
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	pravděpodobně rakouská odrůda, vznikla spontánním zkrřížením odrůd ‘Sylvánské zelené’ x ‘Veltlínské červené’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je tenší až středně silné, tmavohnědé, někdy hůře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený až uzavřený s průsvitem; povrch listu je puchýřnatý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, středně velká, růžová až červenofialová
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Veltlínské červené’ (VČR má však ranější zrání)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost slabší

Faktor vody příliš vlhké, jílovité a silněji vápenité půdy jsou méně vhodné

Faktor půdy nejlépe hlinité půdy, nevadí však i půdy sušší a kamenité

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení

Řez na dlouhý taž

Podnož na hlubokých úrodných půdách SO 4 či T 5C, na lehčích půdách CR 2
či Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití bílá mošťová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum

Choroby a škůdci střední odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči

Plodnost raná, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Odrůdy klony PO-1/10, PO-2/24, PO-3/15, PO-4/15 a PO-4/30

Popis vína vůně vína je spíše neutrální, lehce mandlová až medová, chuť je
sladce nahořklá s jemnou kyselinkou

Doporučená technologie vína burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 37\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

