

Taxon Aspidistra elatior

Název taxonu	Aspidistra elatior
Vědecký název taxonu	Aspidistra elatior
Jména autorů, kteří taxon p...	Blume (1834)
Český název	kořenokvětka vyvýšená
Synonyma (zahradnický pou..	Aspidistra punctata var. albomaculata Hook.; Plectogyne variegata
	Link
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aspidistra

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína, naturalizovaná v Japonsku

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá stálezelená trsnatá bylina, výšky 30-60 cm
Kořen	plazivý, tlustý a krátký oddenek z něhož vyrůstají dlouze řapíkaté listy
Listy	kopinaté, celokrajné, na dlouhých řapících, 30-60 x 10-15 cm velké; tmavozelené a matně lesklé, kožovité, se souběžnou žilnatinou
Květy	6četné, špinavě fialové až hnědočervené, paprscitě souměrné, v průměru 2-3 cm, vykvétají těsně nad zemí; v kultuře kvete vzácně
Plody	tobolka

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	velmi tolerantní vůči nedostatku světla; polostín až stín, ne na přímé slunce, jedna z nejodolnějších rostlin do stinného interiéru

Faktor tepla	studený až poloteplý skleník či interiér; teplota v létě 15-18 °C, přes léto může být i venku; v zimě 7-10 °C
Faktor vody	přes léto udržovat vyrovnanou vlhkost substrátu, zabránit přemokření; při chladném přezimování zálivka omezená; nenáročná na vzdušnou vlhkost
Faktor půdy	humózní substrát s trochou zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	nenáročná stálezelená rostlina pro chladné místnosti, schodiště, haly a chodby; vhodná k řezu
Choroby a škůdci	štítenky, svilušky a puklice při teplém a suchém stanovišti; ve výrazně suchých interiérech zasychají konce listů

Množení

Množení	Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka	dělením trsů na jaře při začátku rašení, oddělek musí mít nejméně 2 listy
Odrůdy	‘Variegata’ - nepravidelně bíle panašovaný list, není příliš rozšířená; ‘Asahi’; ‘Milky Way’ - béžové skvrny; ‘Variegata Ashei’ - bílé proužky; ‘Variegata Exotica’ - pruhovaný list; ‘Amanekawe’ - nepravidelné bílé až krémové skvrny na listech

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník.\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/18404491?tab=references>
- <http://www.biolib.cz/cz/taxon/id62371/>

Grafické přílohy

