

Taxon *Prunus armeniaca* 'Bergeron'

Název taxonu	Prunus armeniaca 'Bergeron'
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Bergeron'
Český název	meruňka obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Gabrielle Bergeron'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Francie, Saint-Cyru-Mont-d'Or
-------------------------------	-------------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Peckovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna vzrůstná, později rozložená
Listy	kulovitě protáhlé, ušlechtilého vzhledu, matné
Květy	bílé, drobné, nenápadné, okrouhlé, blizna v úrovni prašníků, 1 pestík na 25 tyčinek
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	střední až větší (40-45 g), kulovitě oválné, oranžově žluté se světle červeným tečkovaným líčkem, plody nepřezrávají a dobře se přepravují

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	střední (současně s VP)
-------------------------	-------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	5-8 dní po odrůdě Velkopavlovická, pozdní odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná pro typické meruňkářské oblasti, středně náročná na stanoviště, vysoce odolná proti mrazům ve dřevě i v pupenech v době květu
--------------	--

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	čtvrtkmen s centrálním výhonem
Řez	náročnější na řez, vhodný pečlivější výchovný řez
Podnož	M-VA-1 až M-VA-4, M-LE-1

Užitné vlastnosti

Použití	konzervárenství
Choroby a škůdci	málo až středně odolná proti monilióze, citlivá k šarce
Růstové i jiné druhově spec..	středně vzrůstná
Plodnost	brzká, velká a pravidelná (při přeplození nutná probírka)

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

