

Taxon Brassica oleracea var. sabauda

Název taxonu	Brassica oleracea var. sabauda
Vědecký název taxonu	Brassica oleracea var. sabauda
Jména autorů, kteří taxon p...	L., L., Alef, L.
Český název	kapusta hlávková
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. capitata var. sabaud
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středozeří, východní Evropa, Asie
-------------------------------	-----------------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Košťálová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro hlávku tvořenou svinováním listů

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytváří hlávku svinutých zkadeřených či bublinatých listů
Kořen	malý kořenový systém
Květy	žluté
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	dvoupouzdrá šešule
Semena	HTS 3 - 5 g
Vytrvalost	dvouletý

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	rané 50 - 70 dní,letní a polopozdní 100 -120 dní, pozdní 120 - 160 dní, Ozimé 240 - 250 dní
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	60% VVK, v době narůstání hlávek 20 - 25 mm
Faktor půdy	těžší, vododržné, pH 6,3 - 7,8

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	nekrózy vnitřních listů hlávek, okrajové nekrózy (spály) listů, bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternáriová skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květílka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčík (<i>Phyllotreta</i> spp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), zápníček polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlaščičkovitá (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlmorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	rané 0,5 x 0,4 m, polopozdní 0,5 x 0,4 - 0,5, pozdní 0,6 x 0,4 - 0,6 m, ozimé 0,4 x 0,4 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)