

Taxon Clivia miniata

Název taxonu	Clivia miniata
Vědecký název taxonu	Clivia miniata
Jména autorů, kteří taxon p...	Regel (1864)
Český název	řemenatka červená; klívie oranžová
Synonyma (zahradnicky pou..	Clivia sulphurea Laing; Imantophyllum miniatum Hook.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Clivia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, oblast Namibie a Karoo, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - po..	Rod - východní pobřeží jižní Afriky - subtropická oblast mezi Kapskem a Transvaalem; C. miniata: Kwazulu - Natal

Zařazení

Fytocenologický původ	Stanoviště se může lišit od subtropického pobřežního lesa po rokle ve vysokohorském lese. Roste ve stínovaném stínu, často ve velkých koloniích.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	40-50 cm vysoká kvetoucí rostlina s cibulovitě ztlustlou bází zkráceného stonku
Kořen	dužnatě ztlustlé kořeny
Listy	řemenité až čárkovité, obloukovitě prohnuté, dvouřadě uspořádané; pevné až kožovité, obloukovitě odstávající od květního stvolu
Květenství	okolík; 12-20 ks květů
Květy	nálevkovité, červené nebo oranžové se žlutým ústím; kultivary často s barvou žlutou nebo krémovou
Vytrvalost	vytrvalá rostlina
Dlouhověkost	velmi dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	odkvetlé stvolý odříznout, aby nevyčerpávaly rostlinu; během kvetení se rostlina nemá otáčet nebo přenášet

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlo, polostín až stín, ne na přímé slunce; přes léto lze pěstovat venku na přistíněném místě
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	v zimě teplota (8-)15-18 °C; vyžaduje přezimování při nižších teplotách
Faktor vody	v létě pravidelná zálivka, v zimě na chladném místě udržovat v suchu
Faktor půdy	humózní substrát s podílem zahradní zeminy, pH 6,0 - 6,8; rostliny přesazovat nejříve po 2-3 letech po odkvětu

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	výrazná solitérní kvetoucí rostlina; jedna z nejtolerantnějších kvetoucích rostlin do tmavého a chladného interiéru
Choroby a škůdci	vlnatka, puklice, červci; při nadměrné vlhkosti hnědé špičky listů; přímé slunce působí popáleniny na listech; světlé listy a nedostatečná tvorba odnoží z nedostatečné výživy
Růstové i jiné druhově spec..	vytékající mléčná šťáva je jedovatá

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Množení oddělky
Množení - poznámka	odnože nejméně se čtyřmi listy
Odrůdy	‘Citrina’ - žlutobílý kultivar; ‘Burvenich’, ‘Striata’ - pestrolistá odrůda; ‘Abigail’, ‘Aurea’, ‘Doris’, ‘Jenny’, ‘Lemon Chiffon’, ‘Lemon Ice’, ‘Little Charm’, ‘Sabrine Delphine’, ‘San Marcos Yellow’, ‘Solomone Yellow’, ‘Tiny Tim’, ‘Vico Yellow’

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(chladný skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/1201292?tab=references>

Grafické přílohy

