

Taxon Prunus armeniaca ‘Ledana’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Ledana’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Ledana’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, selekce v ČR
-------------------------------	-------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	posledním křížením byly genotypy ‘RR 20-54’ x ‘C4R9T26’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna vzpřímená až mírně rozložená
Květy	velké jako ‘Velkopavlovická’, okrouhlé, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	středně velké, kulaté až válcovité, oranžové s malým červeným líčkem, dužnina oranžová, středně tuhá, rozplývavá, šťavnatá, aromatické, dobrá odlučitelnost, plody se neotlačují

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná
-------------------------	------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	15 dnů před odrůdou ‘Velkopavlovická’, velmi raná odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti mrazům
Faktor půdy	středně náročná na stanoviště, vyžaduje půdy s dostatkem vláhy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	zákrsek, špičák s předčasným obrostem
-----------------	---------------------------------------

Řez	středně náročná na řez
Podnož	M-VA-1 až M-VA-3, M-LE-1 nebo Wagenheimova, myrobalán, zelená renklóda

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, průmyslové zpracování
Choroby a škůdci	středně odolná proti monilióze a Gnomonia erythrostoma
Plodnost	velká a pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

