

Taxon *Malus domestica* 'Ribstonské'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Ribstonské'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Ribstonské'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Ribstoner Pepping', 'Ribstonský jadernáč'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Anglie, vzniklo jako semenáč ze semen dovezených z Rouenu (Francie) v roce 1686 nebo 1688 v zahradě zámku Ribston u Knaresboroughu v hrabství York
-------------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	semenáč
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna mohutná, široce rozložená, později převislá, nepravidelná, středně hustá, základní větve vyrůstají takřka vodorovně
Pupeny	listové pupeny velké, protáhlé, tupě zašpičatělé, přitisklé, sedě plstnaté, sedící na širokých, ostruhovitých patkách s delším, dobře vyznačeným středním žebrem; květní pupeny jsou velké, oválné, tupé nebo tupě kuželovité, načervenalé, velmi silně ochmýřené
Listy	středně velké, eliptické i široce vejčité, tvarově málo vyrovnané, tmavě sivě zelené, matnější, mírně ochmýřené na líci, na rubu velmi silně plstnaté
Květy	středně veliké, široce miskovité. Korunní plátky jsou bílé, více narůžovělé, širší, eliptické, mělce miskovité, zvlňené, vzájemně se většinou nedotýkající; špatný opylovač, vhodnými opylovači jsou 'Bernské růžové', 'Croncelské', 'Gdáňský hranáč', 'Parména zlatá', 'Coxova reneta'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	velké (170 g), kulovité, slupka hladká, někdy drsnější, zlatožlutá s červeným pruhováním s jemnými lenticelami, dužina pevná, sladce

Možnost záměny taxonu (+..

navinulá, vynikající renetovitě chuti, odolnost proti otláčení
Výhony s typickým silným ochmýřením, květní pupeny rovněž silně ochmýřené a velké, plstnaté, světlejší listy, tvar plodu a typické vybarvení.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně raná, bohaté kvetení

Doba zrání

Doba zrání - poznámka zimní odrůda, 1. polovina října, konzumní zralosti dosahuje v listopadu (skladovatelnost do konce února, později však ztrácí chuť, snadno vadne, vyžaduje vlhčí skladování podobně jako Booskopské)

Nároky na stanoviště

Faktor tepla nejlépe vyšší, podhorské oblasti, poměrně mrazuodolná

Faktor vody náročná na vzdušnou vlhkost

Faktor půdy náročná na půdu, vyžaduje vlhčí půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení především vyšší tvary, pro polokmen je vhodný semenáč nebo M 11, čtvrtkmen pěstujeme na M 1 a A2, zákrsy na středně rostoucích podnožích (M 1, 2 a 4), ani na M 9 se neosvědčily (dobře nesnáší řez a jejich plodnost neuspokojuje), pro přísné tvary ovocných stěn je nevhodná

Řez vyžadují delší, ne příliš častý řez

Užitné vlastnosti

Použití konzervárenství

Choroby a škůdci strupovitostí trpí středně, padlím silněji, náchylná k rakovině a k hořké skvrnitosti

Plodnost později až pozdě, podprůměrná, dosti nejistá a nepravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Ribbonské je u nás v současné době pěstováno pouze v extenzivních sadech. V produkčních výsadbách se neuplatnilo. Stromy zpočátku rostou velmi silně, a proto výchovný řez volíme delší. Udržovací řez spočívá především v průklestu. Zmlazování, zvláště hlubší zmlazení plodného obrostu, nesnáší. Stromy dožívají vysokého věku.

Grafické přílohy

