

Taxon Parthenocissus tricuspidata

Název taxonu	Parthenocissus tricuspidata
Vědecký název taxonu	Parthenocissus tricuspidata
Jména autorů, kteří taxon p...	(Siebold & Zucc.) Planch.
Český název	loubinec trojlaločný, trojcípý
Synonyma (zahradnický pou..	Ampelopsis tricuspidata Siebold & Zucc., A. veitchii (Carrière) Graebn.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Parthenocissus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Čína, Korea

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	líána šplhající do výšky 10-20 m
Výhony	s krátkými úponky na konci s přísavnými destičkami
Pupeny	střídavé
Listy	listy dlouze řapíkaté, částečně jednoduché, vejčité, 10-20 cm široké, se 3 zašpičatělými, hrubě pilovitými laloky, částečně i 3četné s vejčitými lístky, leskle zelené, na podzim oranžové či karmínové
Květenství	vrcholík
Plody	plody modročerné, ojíněné, 6-8 mm tlusté

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓

Faktor světla - poznámka	slunce a polostín, v mládí snesou i stín
Faktor tepla	teplo, oblast I-II, namrzá
Faktor vody	snese i sucho
Faktor půdy	na půdu nenáročný

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vyžaduje oporu, po které by se mohl pnout, např. zeď, v mládí vyvázat
Řez	snese řez, můžeme seřezávat každý rok až na 1 pupen

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezóna - listy, podzim - modročerné plody, oranžový nebo červený barvič
Použití	popínavka, vhodnou oporou jí je např. zeď

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka	množit čistý druh můžeme semenem, ale v praxi se spíše využívá řízkování dřevitými řízky, nebo naroubování na kozí nožku na P. quinquefolia
Odrůdy	‘Lowii’ - temně červený barvič, ‘Veitchii’ - list srdčitě vejčitý, barví žlutooranžově