

Taxon *Petrosedum anopetalum*

Název taxonu	<i>Petrosedum anopetalum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Petrosedum anopetalum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(DC.) Grulich
Odrůda	‘Centaurus’
Český název	rozchodník bleďožlutý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Sedum ochroleucum</i> Webb.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Balkánská pohoří, především v termofytiku a mezofytiku

Zařazení

Fytcenologický původ	petrofyt, phellofyt - na vápencích vystupuje k 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nár...	skalky, suché zídky, extenzivní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus	poléhavě polštářovitá trvalka
Kořen	adventivní, nitkovitý
Výhony	sterilní poléhavé, vystoupavé, velmi hustě olistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1-0.2 m
Listy	cylindrické - silně dužnaté, osinkatě špičaté, tmavozelené nebo šedivě ožíněné, často purpurově nabělé
Květenství	vzpřímené, vidlanovitě větvené, žláznaté vijany bez listenů
Květy	heterochlamydeické, šestičetné, zvonkovitě sevřené, bledě žluté, diplostemonické, pestíky v receptakulu ze srostlých sepalů
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena	velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná
Možnost záměny taxonu (+..	na deset v nekvetoucím stavu snadno zaměnitelných druhů rodu - za květu snad jen s <i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, nápadně robustním taxonem s květy hvězdovitě rozevřenými v nežláznatých vijanech

Dlouhověkost relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červen
Konec doby kvetení Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka heliofyt
Faktor tepla mrazuvzdorná do -25°C (USDA)
Faktor vody xerofyt
Faktor půdy propustná, pH 5.5-7.0
Faktor půdy - poznámka přizpůsobivý taxon, upřednostňuje však půdy zásadité

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná.. hodnocení Hensen & Groendijk-Wilders (1984) i Sieber (1989, pro odrůdu 'Centaurus'): upotřebitelné pro zahrádkáře
Doporučený spon pro výsad.. 16-24 rostlin na m²

Množení

Množení Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřík segmentů (extenzivní střešní zeleň)
Konečné hrnky 8 cm
Retardace ne
Květní tvorba exaktní data nedostupná
Odrůdy množství populací lišících se zabarvením a ojíněním listů - prozatím jen 'Centaurus' s listy purpurově stínovanými pod odrůdovým jménem

Ostatní

Poznámka Legenda ke grafické příloze 1 - Uher-Petrosedum.varia: 1. Petrosedum anopetalum; 2. Petrosedum sediforme; 3.

Petrosedum rupestre 'Angelina'; 4. Petrosedum rupestre; 5. Petrosedum montanum 'Jenny'; 6. Petrosedum forsterianum 'Elegans'

Odkazy

- Gallo L. (2009): Sedum ser. Rupestris Berger (Crassulaceae): work in progress toward a checklist of taxa and their distribution. *Bocconeia* 23: 203-205; Grulich V. (1984): Generic division of Sedoideae in Europe and adjacent regions. *Preslia* 56 (1): 29-45;

Grafické přílohy



