

Taxon Tillandsia usneoides

Název taxonu	Tillandsia usneoides
Vědecký název taxonu	Tillandsia usneoides
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) L. (1762)
Český název	tillandsie provazovkovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Dendropogon usneoides (L.) Raf.; Renealmia usneoides L.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Tillandsia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Neotropická květenná říše, Karibská oblast, Orinocká oblast, Andská oblast a oblast temperátních jihoamerických lesů
Biogeografické regiony - po..	USA: Virginie, Texas až Florida; Mexiko; Jižní Amerika: Argentina, Chile; zavlečená i do tropů starého světa

Zařazení

Fytocenologický původ	tropický epifyt, roste přichycený na stromech, skalách i na venkovních konstrukcích a plotech
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výrazná kolonie drobných listových růžic; zelenavé stonky i listy jsou pokryty drobnými stříbřitými šupinkami; za sucha je šedá, po navlhnutí zelená; výrazně převislý charakter růstu, rostliny na původních stanovištích až 8 m délky
Kořen	primární kořinky mají pouze malé semenáčky, při růstu zanikají a rostlina je zásobována vodou a živinami pouze prostřednictvím šupinovitých trichomů na listech a výhonech
Výhony	nitkovité, bohatě větvené výhonky, cca 1 mm silné, spirálovitě kroucené a dosahují značných délek; vynikající regenerační schopnost, snadno odnožuje, vyskytuje se ve velkých koloniích
Listy	nitkovité, podobné výhonům stonků, jsou 1,5–6 cm dlouhé, mírně zploštělé a zašpičatělé
Květy	drobné a nenápadné, vyrůstají zřídka v paždí listů; trojčetné, zelenožluté až namodralé korunní plátky 8–10 mm dlouhé, ohnuté

	nazpět; kratší blanité kališní lístky; příjemně vonné; zřídka kvete
Plody	válcovitá zašpičatělá tobolka, asi 2,5 cm dlouhá

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce až polostín, ne na plné slunce
Faktor tepla	teplý skleník; v zimě 18-22 °C, nesmí klesnout pod 15 °C
Faktor vody	vyžaduje vyšší RVV, kterou je nutné zajišťovat rosením; velmi citlivá na znečištěné ovzduší
Faktor půdy	rostlina pěstovaná výhradně epifyticky
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	rostliny do tropických interiérů (okenní skleníky, vitríny, skleníky), s vysokou teplotou a vzdušnou vlhkostí

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Listové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	rozmnožuje se semeny nebo drobnými dceřinými růžicemi v paždí listů odkvetlých odumírajících rostlin

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	---

Ostatní

Poznámka	kykatka provazovkovitá; "španělský mech"
Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/4300586?tab=references

Grafické přílohy

