

Taxon Vitis vinifera Muller Thurgau

Název taxonu	Vitis vinifera Muller Thurgau
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Müller Thurgau’ (MT)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Riesling-Silvaner, Rivaner, Müllerka
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	odrůdu nakřížil v Německu H. Müller (původem ze švýcarského kantonu Thurgau), křížením odrůd ‘Ryzlink rýnský’ x ‘Madlenka královská’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle žlutavě hnědé, někdy hůře vyzrávajících
Pupeny	středně velké až velké, tupé
Listy	velké, okrouhlé, výrazně pěti i vícelaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený, často lehce překrytý ; povrch listu je lehce puchýřnatý, vespodu žilnatin slabě ochmýřený
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý hrozen s křídélky; bobule kulatá až elipsovitá, středně velká, zelenožlutá
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Veltlínské zelené’ (MT má však ranější zrání a méně plstnatou spodní stranu listu)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité i suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nejlépe hlinité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažnících však více plodí
Podnož	pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože LE-K/, Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 i T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	nízká odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Odrůdy	klony PO-2/15, PO-5/12, KA-23/37, KA-25/7 a KA-43/25
Popis vína	vůně vína je lehce muškátová s ovocnými tóny (kopřivově-broskvovými), chuť také ovocná po angreštu, broskvích až citrusech, s jemnou kyselinkou
Doporučená technologie vína	burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

