

Taxon Prunus armeniaca ‘Sunglo’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Sunglo’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Sunglo’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, 1942
-------------------------------	-----------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Peckovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvoří vznosnější a řídké koruny
Listy	středně velké, lesklé, mírně srdčité, zakončeny ostrou špičkou
Květy	bílé, libovonné
Plody	střední velikosti, při velké násadě ale menší, oválné, slupka pevná, mírně plstnatá, základní barva oranžově žlutá, krytá červeným líčkem, ve kterém jsou tmavě červené tečky, dužnina oranžová, šťavnatá, rozplývavá, chuť sladce navinulá, osobitá, dobrá, pecka je menší, dobře odlučitelná od dužniny

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, dlouze kvete
-------------------------	--------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	střední, zraje 4-6 dní po ‘Velkopavlovická’
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	dobře mrazuodolná ve dřevě i v pupenech
Faktor půdy	vyhovují hlinito-písčité půdy, pH 5,5-8,0

Užité vlastnosti

Růstové i jiné druhově spec.. středně bujný růst

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Ostatní

Poznámka Sunglo' patří mezi plodné odrůdy se sklonem při velkých úrodách k
drobnosti plodů.

Grafické přílohy

