

Taxon Vitis vinifera Original

Název taxonu	Vitis vinifera Original
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Original’ (Or)
Český název	Réva vinná pravá
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o ukrajinskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Damaskaja roza (Damascenka růžová)’ x ‘Villard Blanc (SV 12 375)’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, červenohnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, tři až pětilaločnaté s výraznými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velmi velký, kuželovitý, spíše řidší hrozen; bobule je velmi velká, zahnutě podlouhlá, tmavě růžové barvy
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	červená stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, v podzimních mrazících opadávají bobule z třapin
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 5-8 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, příjemně chruplavá, chuť neutrální

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 127)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

