

Taxon Scilla bifolia

Název taxonu	Scilla bifolia
Vědecký název taxonu	Scilla bifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	ladoňka dvoulístá
Synonyma (zahradnický pou..	Ornithogalum bifolium (L.) Neck.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Scilla

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Je domácí ve větší části Evropy (od Španělska přes Belgii, po Ukrajinu) v západní Asii (Sýrie, Turecko) a na Kavkaze. Značné množství synonym odráží nejen široký areál rozšíření, ale i velkou vnitrodruhovou variabilitu vzhledu i dlouhou dobu záměrné kultivace.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Nejčastěji ji lze nalézt na loukách, na okraji dřevin či ve světlých listnatých lesích. Je variabilní ve výšce (5-20 cm) i v barvě květů, které bývají nejčastěji v odstínech modré a fialové barvy, vyskytují se však jedinci s květy bílými a růžovými. Hvězdičkovité květy jsou uspořádány v jednostranném květenství. Kvete nejčastěji v březnu a dubnu.

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Svazčité vyrůstající z podpučí cibule.
Pupeny	Jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Z cibule vyrůstají kromě květních stonků dva až tři žlábkovitě prohnuté, kápovitě zakončené listy. Patří mezi naše chráněné rostliny.
Plody	Plodem je kulovitá tobolka.
Vytrvalost	Na stanovišti velmi dobře vytrvalá.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor půdy - poznámka	Nenáročný druh na půdní podmínky.

Užitné vlastnosti

Použití	Vzhledem k brzké době kvetení jsou ladoňky jednou z prvních ozdob zahrad, které krásně vyniknou jak v trávniku a v podrostu dřevin, tak na skalkách a trvalkových záhonech. Vzhledem k jejich drobnému vzrůstu je vhodná jejich výsadba v blízkosti cest. Mohou se také rychle šířit.
Choroby a škůdci	Rostliny mohou být napadány několika houbovými chorobami, které však obvykle nezpůsobují větší škody. Cibule mohou být napadány chorobami z rodu Botrytis, Penicillium, Sclerotium viz. Tulipa L.

Množení

Množení - poznámka	Většina ladoněk se množí velmi dobře pomocí dceřiných cibulek a v dobrých podmínkách také samovýsevem. Semena po zahradě roznáší mravenci, proto rostlinky často rozkvétají na překvapivých místech.
--------------------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	D 4: záhon od odhlučňovací zdi podél... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2014
Dodavatel	Jošt Import Heřmanův Městec

Grafické přílohy

