

Taxon Vitis vinifera Cab franc

Název taxonu	Vitis vinifera Cab franc
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Cabernet Franc’ (CF)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Grosse Vidure, Cabernet Franco
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	pochází z Francie patrně z oblasti Bordeaux, přesné křížení není známo, předpokládá se, že jde o genetickou „matku všech kabernetů“

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední bujný růst s řidším olistěním
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávajcí
Pupeny	menší až středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté, hluboce lyrovitě vykrajované, bazální výkroj je většinou otevřený; povrch listu je vrásčitý, tmavě zelený, spodní strana listu je plstnatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý hrozen, spíše řidší; bobule je malá, kulatá, tmavě modré barvy
Semena	menší až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Cabernet Sauvignon (CF mívá řidší hrozen a větší listy)

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	snáší i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	do sušších a vápenějších půd Fercal a CR 2, pro úrodné půdy a vyšší tvary Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	citlivá k houbovým chorobám, odolnější k plísni šedé
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 5 - 8 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má rubínovou barvu a specifickou odrůdovou chuť jako Cabernet Sauvignon, ale jemnější
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, rosé, kupáže, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113, 114\)](#)

Grafické přílohy

