

Taxon Abies holophylla

Název taxonu	Abies holophylla
Vědecký název taxonu	Abies holophylla
Jména autorů, kteří taxon p...	Maxim.
Český název	jedle pichlavá (jehlicovit á)
Synonyma (zahradnicky pou..	nepoužívají se
Autor	Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Abies

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	hory a podhůří v Mandžusku a Koreji

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v mládí kuželovitý, později spíše válcovitý se zaobleným vrcholem, 25-30m
Výhony	žlutavé, mělce, spíše nepravidelně rýhované, lysé
Pupeny	kuželovité hnědé, zvláště na bázi pryskyřičnaté
Listy	postavení jehlic na větvičce je ve spodní části koruny často hřebenité, na osluněných částech a ve výše položených partiích koruny spíše rozčísnuté až radiální, 25-40 x 2-2,5 mm velké jehlice jsou tuhé, zakončené ostrou nápadnou špičkou (osluněné jsou tupě špičaté), na líci leskle živě zelené, na rubu se dvěma nevýraznými šedavými pruhy
Plody	šišťice 8-16 cm dlouhé, válcovitě protažené, se zaobleným vrcholem, na povrchu s pryskyřicí
Kůra a borka	světle žluto hnědá borka s brzkou tence šupinovitou odlučností, charakterem připomínající borku smrků
Možnost záměny taxonu (+..	Abies firma - žluté krátce pýřité větévký, suchý pupen, tuhé jehlice jsou dvojřadě postavené a zakončené nápadným výkrojkem - až dvojhroté
Dlouhověkost	středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	zejména v mládí jako většina jedlí stínomilná, v dospělosti i plné oslunění
Faktor tepla	mrazuvzdornost v ČR není dosud plně prověřena, v nižších polohách mrazuvzdorná dobře, vhodná pro oblasti I-III., extrémní polohy jsou nevhodné
Faktor vody	půdy čerstvě vlhké, případně dobře zásobené vodou
Faktor půdy	ideální živná stanoviště spíše na kyselých podkladech

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	X-III
Použití	skupinky, solitéry, perspektivní doplňkový druh
Choroby a škůdci	významější nejsou

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka	základní druh lze generativně, většinou roubováním

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [BZA - Panoptikum / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)