

Taxon Berberis thunbergii ‘Carmen’

Název taxonu	Berberis thunbergii ‘Carmen’
Vědecký název taxonu	Berberis thunbergii
Jména autorů, kteří taxon p...	DC.
Odrůda	‘Carmen’
Český název	dříšťál Thunbergův
Synonyma (zahradnický pou..	Berberis japonica, Berberis sinensis
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. atropurpurea
Nadřazená kategorie	Berberis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
------------------------	------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 2 m, hustý, úzký, sloupovitě rostoucí
Výhony	letorosty hranaté a s červenohnědé, s tmny jednoduchými až 3dílnými, 5–15 mm
Pupeny	střídavé
Listy	řapíky 2–8 mm nebo téměř chybí, svrchu karmínově červená, obvejčitá, kopistovitá nebo kosočtverečně vejčitá, někdy vejčitá, na podzim šarlatově červená a oranžová, 5–35 × 3–22 mm velká, papírovitá, oboustranně lysá, báze protažená, klínovitá, okraj plochý, celokrajný, vrcholek tupý nebo zaoblený, někdy hrotitý
Květenství	po 1 - 5 v okolíčnatých květenstvích
Květy	stopky květů 5–10 mm, sepaly ve 2 kruzích, vnější červenavé a vejčitě eliptické, 4–4.5 × 2.5–3 mm velké, vnitřní široce eliptické, 5–6 × 3.3–3.7 mm velké, petaly podlouhle obvejčité, 5.5–6 × 3–4 mm
Plody	plody jasně či šarlatově červené, elipsoidní nebo kulovité a 7–10 × 4 mm velké
Semena	1 - 2 na plod
Kůra a borka	červenohnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilný,
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilný, ve stínu se listy nevybarvují zůstávají zelené
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 4 (do - 34°C)
Faktor vody	nemají rádi přemokřené půdy
Faktor půdy	neutrální, snesou i suché, kamenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	dle použití
-----	-------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezona
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, živé ploty
Choroby a škůdci	Přeslenatka obecná, bakteriální skvrnitost listů a výhonů, pilatěnka dříšťálová

Množení

Množení	Přímý výsev, Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka	Generativní množení je možné, ale potomstvo je variabilní, v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary druhu Berberis thunbergii množení řízkováním

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem (Matečnice)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca

30 cm nad zemí)