

Taxon Quercus cerris

Název taxonu	Quercus cerris
Vědecký název taxonu	Quercus cerris
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	dub cer
Synonyma (zahradnický pou..	Quercus austriaca Willd.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Quercus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom až 35 m vysoký, velmi variabilní tvar koruny, celkově spíše užší
Výhony	pýřité, nebo žluto - šedě plstnaté, hranaté
Pupeny	kryté četnými, střechovitě uspořádanými šupinami, postranní i koncové pupeny s dlouhými nitkovitými, vytrvávajícími palisty
Listy	opadavé, eliptické až podlouhlé, 6 - 12 cm dlouhé, se 4 - 9 přpičatělými laloky, mají krátké řapíky a zpeřenou nervaturu, hrubě zubaté až peřenosečné, líc lesklý tmavozelený, drsně chlupaté, rub žlutozelený, hvězdovitě pýřitý
Květenství	jehnědy
Květy	samčí jsou drobné, v přetřhovaných, nících jehnědách, samičí květy jednotlivé, tvoří po dvou nebo ve větším počtu jehnědy
Plody	žalud ponořen v číšce do poloviny, číška s odstálými, štětinkovitými šupinami
Kůra a borka	v mládí tmavošedá, nazelenalá, později šedá, hrubě rozpukaná borka, v prasklinách rezavý
Možnost záměny taxonu (+..	druh charakteristický vytrvalými šídlovitými palisty u pupenů
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	žaludy lze sklízet po opadání nebo i dříve setřásáním ze stromů
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla	vyžaduje slunné polohy, jinak středně světlo milný
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	náročný na teplo, oblasti I-II, choulostivý na silné mrazy, snadno praská
Faktor vody	značně odolný k suchu
Faktor půdy	roste na vápenitém stanovišti, snáší dobře i kyselé, mělké a chudé podklady
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití	do smíšených skupin nebo jako jejich předsadba i jako solitera, v jižních oblastech vhodný i do krajiny
Růstové i jiné druhově spec..	krásný parkový strom, jemná textura

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka	roubováním se rozmnožují kultivary, jako podnož slouží původní druh Q, cerris, který slouží i jako podnož pro stálezelené druhy
Odrůdy	‘Argenteovariegata’ - má listy na okraji široce a nepravidelně žlutobíle lemované

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici](#)