

Taxon Pyrus pyrifolia Nashi ‘Zaosuli’

Název taxonu	Pyrus pyrifolia Nashi ‘Zaosuli’
Vědecký název taxonu	Pyrus pyrifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	(Burm.) Nakai
Odrůda	‘Zaosuli’
Český název	hrušeň asijská
Synonyma (zahradnický pou..	Nakai
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Pyrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Výzkumný ústav ovocnářský (Čínská akademie zemědělských věd)
-------------------------------	--

Zařazení

Fytoocenologický původ	křížení "Pingguo Li" x "Shenbu Zhi"
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Plody	velké, průměrná hmotnost 250 g, obvejčité s hladkým povrchem, žlutozelené, drobné tečkování na slupce, dužnina křuplavá, bílá, jemná, velmi šťavnatá, sladká, refrakce 15° Brix
-------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec června-začátek července (skladovatelnost pouze 1,5 měsíce, do konce srpna), nejčasnější odrůda čínských hrušní
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor vody	odolává dobře obdobím sucha
-------------	-----------------------------

Užitné vlastnosti

Použití	konzervování
Choroby a škůdci	odolná proti strupovitosti a rzi hrušňové
Plodnost	brzká, vysoká

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba hrušní\)](#)

Ostatní

Poznámka vysoce adaptabilní

Grafické přílohy

