

Taxon *Ostrya carpinifolia*

Název taxonu	Ostrya carpinifolia
Vědecký název taxonu	Ostrya carpinifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	Scop.
Český název	habrovec habrolistý
Synonyma (zahradnický pou..	Ostrya italica Winkl.; Ostrya vulgaris Willd.; Ostrya ostrya, Karst.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ostrya

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	suché skalnaté svahy

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom 8-15(-20) m vysoký, s kulovitou korunou
Výhony	letorosty v mládí chlupaté, později lesklé a olivově hnědé, bez stopkatých žlázek
Pupeny	střídavé, zelenavé
Listy	úzce vejčité až vejčitě kopinaté, 5-10 cm dlouhé, ostře dvojitě pilovité, svrchu tmavě zelené, řídce chlupaté, naspodu 11-15 párů žilek chlupatých
Květenství	jehnědy
Květy	jednopohlavné, samčí jehnědy štíhlé v paždí podpůrného listenu, založené již na podzim, samičí koncové, vzpřímené
Plody	3-5 cm dlouhé, oříšky vejcovité uzavřené v měchýřkovitém zákrovu, tvořící šišticovitě plodenství připomínající chmel
Kůra a borka	šedá, šupinovitě odlupčivá
Možnost záměny taxonu (+..	Carpinus betulus (plod má trojlaločné křídlo; borka rozpraskaná i na mladších jedincích)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	kvete s rašením

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	plodenství sklízíme na začátku září
-----------------------	-------------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	polostinná dřevina
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblasti I-II
Faktor vody	snese sucho
Faktor půdy	spokojí se se středně těžkou, hlinitou půdou, daří se jí i v propustných i silně kamenitých půdách
Faktor půdy - poznámka	má menší nároky než habr

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	na podzim žlutý barvič
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	okraje porostů i podrosty, výplňová dřevina
Růstové i jiné druhově spec..	nenápadná dřevina velmi podobná habru, atraktivní plody, žlutý barvič

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka	roubuje se na podnože Carpinus betulus
Odrůdy	‘Nana’ - kulovitý hustý keř, s pravidelně laločnatými listy; ‘Pendula’ - větve přemisají, roubuje se na korunku, listy laločnaté, větší než u druhu; ‘Pyramidalis’ - sloupovitý habitus; ‘Laciniata’ - listy pravidelně hluboce stříhané

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)