

Taxon *Ajuga genevensis*

Název taxonu	<i>Ajuga genevensis</i>
Vědecký název taxonu	<i>Ajuga genevensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linn. (1753)
Český název	zběhovec lesní
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Bugula genevensis</i> (L.) Mill., <i>Teucrium genevense</i> (L.) Crantz
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ajuga

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa – od Francie až po Ural, dále Zakavkazí, východní Turecko, Írán. U nás se vyskytuje na většině území, především v nižších a středních polohách, ojediněle vystupuje až do hor

Zařazení

Fytocenologický původ	roste na loukách, mezích, stráních, v lesních lemech
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálezelná
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kobercovitá trvalka bez nadzemních výběžků, do 0.1 m vysoká (za květu jen o málo vyšší)
Kořen	adventivní z oddenků
Výhony	hrnaté, oddáleně vstříčně olistěné, kvetoucí lodyhy přímé, nevětvené, jemně až hustě pýřitá
Listy	přezimující listy v chudé přizemní růžici jsou krátce řapíkaté, obvejčité až eliptické, 5–12 mm dlouhé a 2–5 mm široké, tupě zubaté, jemně chlupaté, vespod lysé. Lodyžní listy přisedlé, v horní části oddáleně zubaté
Květenství	hrozen - květy po 4 - 12 v lichopřeslenech chráněných listeny, které jsou většinou trojlaločné a nafialovělé
Květy	zygomorfní, různobalné, srostloplátečné, pětičetné s redukovaným horním a tojlaločným spodním pyskem, modré nebo modropurpurové (někdy bílé či růžové), se čtyřmi dvoumužnými

	vyčnívajícími tyčinkami
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	tvrdky
Možnost záměny taxonu (+..	zaměnitelná s blízkými <i>Ajuga reptans</i> (s jednoduchými téměř lysími listy v květenství a s výběžky) nebo <i>Ajuga pyramidalis</i> L. (s listy zvětšenými a sblíženými v jehlanovité klasy, bez výběžků); situaci však komplikují rovněž občas pěstované intermediální hybridy všech tří druhů (<i>Ajuga</i> x hybrida Kern., <i>A. x hampeana</i> Br.& Vatke)
Dlouhověkost	relativně dlouhověká, z nevhodných stanovišť rychle mizí
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Červen
Remontování	✓
Remontování - poznámka	mnohé klony chudě znovu nakvétají v pozdním podzimu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	preferuje světlo, k polostínu tolerantní
Faktor tepla	mrazuvzdorná
Faktor vody	upřednostňuje sušší stanoviště
Faktor půdy	propustná, spíše neutrální (pH 5.8-7.2), nezasolená (EC do 1.0 mS.cm), humózní a výživná
Faktor půdy - poznámka	přizpůsobivá na bazických i kyselých horninách, indikátor bohatých půd

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, A - Alpinum a OV - Okraj vody
Choroby a škůdci	početné askomycety: <i>Sphaerotheca</i> , <i>Ramularia</i> , <i>Athelia</i> (<i>Sclerotium</i>), <i>Colletotrichum</i> , <i>Alternaria</i> , <i>Corynespora</i> , <i>Myrothecium</i> , <i>Stemphylium</i> , <i>Botryotonia</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Pythium</i> , <i>Fusarium</i> ; ze škůdců svilušky (<i>Tetranychus</i>), mšice (<i>Myzus</i>), háďátka (<i>Meloidogyne</i> , <i>Pratylenchus</i>)
Doporučený spon pro výsad..	12 - 16 ks/m ²

Množení

Množení Předpěstování sadby, Množení oddělky, Množení šlahouny a „in vitro“ (mikropropagace)

Grafické přílohy

