

Taxon Vitis vinifera Ortlíbske

Název taxonu	Vitis vinifera Ortlíbske
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Malingrovo rané’ (Mr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Malingr raný, Hedvábné rané, Précoce de Malingre, Malaga
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší evropská odrůda, vypěstována v roce 1840 zahradníkem Malingrem v Paříži ze semene neznámého původu

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, válcovitý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, žlutozelená (ve stínu zelená), s hnědými tečkami
Semena	malá až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé, otevřené, větmější polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité i suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažnících však více plodí
Podnož	pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4 a CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda (dřívě i stolní) - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	nízká odolnost k houbovým chorobám, citlivá zejména k plísni šedé
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 6-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je rosolovitá, sladké chuti; víno je extraktivní, se svěží kyselinkou, odrůdového charakteru
Doporučená technologie vína	burčák, stolní a jakostní vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 132)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

