

Taxon Ulmus minor

Název taxonu	Ulmus minor
Vědecký název taxonu	Ulmus minor
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill. emend. Richens
Český název	jilm habrolistý
Synonyma (zahradnický pou..	Ulmus carpinifolia Ruppert ex Suckow
Autor	Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D. (ing._p_emysl_krej_i_k_ph.d.@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ulmus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	Domácí; Evropa, severozápadní Afrika, Malá Asie, Kavkaz.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Strom 15-30 m vysoký, koruna široce vejčitá, kořenové výmladky, u starších jedinců uzlovité výrůstky na kmeni.
Výhony	Letorosty lysé nebo jen řídce chlupaté, některé typy mají větvičky s korkovými lištami.
Pupeny	Jednobarevné, tmavé.
Listy	Elipčité až obvejčité, 12-14 párů nervů, líc lesklý, lysý, rub lysý, krátce řapíkatý; listy na výmladcích řídce drsně štětinatě chlupaté.
Květenství	V hustých svazečcích, tmavě červené, téměř přisedlé; II-III.
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	Nažky se semenem u horního okraje elipčitého křídla, 1-2 cm dlouhé, lysé, přisedlé; velmi brzy opadávají.
Kůra a borka	Šedohnědá, rozbrázděná, některé typy mají vystouplé korkovité lišty.
Možnost záměny taxonu (+..	Ulmus laevis - listy na rubu hustě chlupaté, líc roztroušeně chlupatý až lysý, 15-20 párů žilek; pupeny dvoubarevné. Ulmus glabra - listy někdy se třemi výraznými zuby, líc drsný, rub řídce chlupatý, 12-14 párů nervů; větvičky někdy s korkovými lištami. Ulmus pumila - listy lysé, 10-12 párů nervů, listy jsou výrazně dvojřadě uspořádané;

	konce větvi převisají.
Dlouhověkost	Středněvěká rostlina.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Březen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	Oblast I-III.
Faktor vody	suchovzdorný, ale roste i v lužních polohách.
Faktor půdy - poznámka	hlubší živné půdy, lužní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	Spíše nenápadný strom, hezké jsou korkové lišty na větvičkách mladých jedinců.
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	Do krajiny, doplňková dřevina do parků, ale díky grafióze se téměř nevysazuje.
Choroby a škůdci	grafiosa jilmů

Množení

Množení	Přímý výsev
Množení - poznámka	Výsevem semen hned po dozrání.
Odrůdy	var. suberosa (Moench.) Rehd. - malý stromek, korkovité lišty spíše na starších výhonech, list řídce chlupatý.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - nespecifikováno / Zámecký park v Lednici](#)

Ostatní

Stáří vzorku 30 let

