

Taxon Brassica rapa var. rapa

Název taxonu	Brassica rapa var. rapa
Vědecký název taxonu	Brassica rapa var. rapa
Jména autorů, kteří taxon p...	L. Thell
Český název	vodnice
Synonyma (zahradnický pou..	Brassica rapa subsp. Rapa (DC) Metzger
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. Rapa
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Řecko, Řím
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro bulvu

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytváří přizemní listovou růžici
Kořen	kulovité, oválné, vřetenovité, bílé až nažloutké, na temeni zelené, hnědé, fialové
Listy	řapíkaté, zpeřené
Plody	šešule
Semena	drobná, hnědá, kulovitá, HTS 2,3 - 2,5 g
Vytrvalost	dvouletý

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	vykete za 40 dní po výsadbě bulv
-------------------------	----------------------------------

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Listopad

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor tepla	nenáročný na teplotu, optimum do 20 °C
Faktor vody	nenáročný na vodu, lepší vyšší půdní vlhkost
Faktor půdy	mělké i hlubší půdy, bramborářská oblast

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), virová mozaika vodnice (Turnip mosaic virus - TuMV), další choroby jako u košťálové zeleniny
Doporučený spon pro výsad..	0,2 - 0,4 x 0,1 - 0,2 m

Množení

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)