

Taxon Sambucus nigra

Název taxonu	Sambucus nigra
Vědecký název taxonu	Sambucus nigra
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	bez černý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Viburnaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Kavkaz, Malá Asie, Arménie, západní Sibiř

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř, stromovitý keř až stromek
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř, stromovitý keř až stromek, výška 4-6 (10) m, přizemní partie zpravidla holé
Výhony	letorosty (šedavě) zelené
Pupeny	vstřícné
Listy	listy nejčastěji s 5-7 lístky, vejčitě kopinatými nebo vejčitě eliptickými, 4-10 cm dlouhými
Květenství	plochá květenství, 10-25 cm
Květy	květy žlutavě bílé, vonné
Plody	plody zprvu červené, později černofialové až černé, 6-8 mm tlusté
Kůra a borka	borka korkovitá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	nenáročný, otužilý
Faktor vody	má raději vlhčí půdy
Faktor půdy	humózní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI-VII - květ, později plody
Použití	v krajině, volně rostoucí živý plot, využitelný pro lékařství a potravinářství, zajímavé kultivary
Choroby a škůdci	mšice

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Bylinné řízky
Odrůdy	‘Aureomarginata’ - list žlutopestrý, ‘Laciniata’ - list stříhaný