

Taxon Vitis vinifera Damascenka

Název taxonu	Vitis vinifera Damascenka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Damascenka’ (Da)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Ceaus belyj, Bicane, Panse jaune, Damaškový hrozen
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starobylá odrůda neznámého křížení odněkud z Malé Asie (Damašek) nebo Balkánu

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní bílá odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	velké až velmi velké, pěti až sedmilaločnaté, s velmi výraznými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, uzavřený s průsvitem; povrch listu je vrásčitý, vespod plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen velký, válcovitě kuželovitý, občas křídlatý, středně hustý, někdy volnější až řídký (závisí od opylení); bobule je velká, kulatá až mírně oválná, zpočátku bledě zelená, později zlatožlutá
Semena	velká, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 i T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	citlivá k houbovým chorobám i mrazům, sprchává, pokud nemá v okolí opylovače (kvete ženským květem)
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, příjemné mírně muškátové chuti

Celky sbírek

- Celky sbírek v areálu ZF
- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

Ostatní

- Odkazy
- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

