

Taxon Ficus parietalis

Název taxonu	Ficus parietalis
Vědecký název taxonu	Ficus parietalis
Jména autorů, kteří taxon p...	Blume (1825)
Český název	fíkovník třešňotvarý
Synonyma (zahradnický pou..	Ficus cerasiformis Desf.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. rufipila Miq.
Nadřazená kategorie	Ficus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indočínská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	z Thajska a Vietnamu přes Sundy na Molukky a Filipíny

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt, amnochtofyt – tropické monzunové a sekundární lesy do 1400 (2000) m n.m., často na písčitých březích vodních toků
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nízký strom, zřídka přes 10 m vysoký, často hemiepifyt
Výhony	drsně pýřité (trichomy kaštanově zabarvené), dvouřadě olistěné
Listy	hrotnatě elipčité, pergamenovité s nápadně vyniklou síťnatou nervaturou, živě zelené, zhruba 0.1 m dlouhé (v dospělosti větší), roztroušeně a drsně pýřité, s cystolity, s celokrajnými nebo oddáleně zubatými a víceméně podvinutými okraji; palisty přitiskle hnědě pýřité, opadavé
Květenství	neveliká, globosní, bradavičnatá a roztroušeně pýřitá receptakula (fíky), žlutá, oranžová nebo rumělkově červená, soliterní i párovitá, na starém dřevě též v chomáčích
Květy	drobné s masitými, bílými tepaly - všechny trojčetné, samčí s dvěma tyčinkami
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	drobné elipčité nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	kdysi spojována s F. tinctoria Forst, zaměnitelná též s F. virgata

	Blume nebo <i>F. subulata</i> Blume (všechny s přetrvávajícím peridermem výhonů a s širšími, asymetrickými, kožovitějšími, voskově lesklými listy)
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	za dostatku světla vyvíjejí sykonia souběžně s tvorbou nových listů
-------------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	množení 16 klux, produkce 32-48 klux; k déleodobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2-4 klux
Faktor tepla	20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 18°C-24°C / 20°C léto (za vyšší RVV i optimum teplot vyšší), 16°C-18°C v zimě
Faktor vody	RVV: produkce 80% a více, v bytech a prodejnách halách nejméně 60%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází k poškození listů
Faktor půdy	především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Choroby a škůdci	rzi (<i>Physopella</i> , <i>Cerotelium</i>) a početné deuteromycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Macrophoma</i> , <i>Diplodia</i> , <i>Septoria</i> , <i>Glomerella</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Pellicularia</i>); ze škůdců svilušky (<i>Eotetranychus</i>), červci (<i>Planococcus</i> , <i>Ceroplastes</i> , <i>Paratachardina</i>), třásněnky (<i>Gynaikothrips</i>), molice (<i>Paraleyrodes</i>), bejlo morky (<i>Horidiplosis</i>), háďátka (<i>Pratylenchus</i> a <i>Aphelenchoides</i>)
Doporučený spon pro výsad..	produkce: 6 cm množárenské hrnky 128-160 /m ² ; 9-10 cm mezihrnky 48-56 /m ² ; v konečných 12 cm hrnkách 20-28 /m ²

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	vrcholové řízky s 5-6 listy po třech do 6 cm hrnků
Mezihrnky	multi-pack nebo hrnky 6 cm
Konečné hrnky	hrnky 10-12 cm (v konečném sponu 32 rostlin na m ²) nebo větší dle velikosti expedovaných rostlin

Retardace	ne
Květní tvorba	nedostatečně známa – neověřována
Reakční doba	nedostatečně známa – neověřována
Doba kultivace	v 8-9 cm hrnkách v létě deset-dvanáct týdnů, v zimě do šestnácti týdnů (menší rostliny s výhony o 15-20 listech)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

Poznámka zralá sykonia jsou jedlá

Odkazy

- Stahn B.& al. (1987): Grünpflanzen in Tabellen und Übersichten. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin;
- Berg C.C.& Corner E.J.H (2005): Flora Malesiana vol.17-2 Moraceae- Ficus, Nat.Herb.Nederland, Leiden

Grafické přílohy



