

Taxon Anemone hupehensis

Název taxonu	Anemone hupehensis
Vědecký název taxonu	Anemone hupehensis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Lemoine) Lemoine (1910)
Český název	sasanka japonská
Synonyma (zahradnický pou..	Anemone japonica var. hupehensis Lemoine, Anemone japonica (Thunb.) Siebold et Zucc., nom. illeg., Anemone scabiosa H. Lév. et Vaniot, Anemone vitifolia var. japonica (Thunb.) Finet et Gagnep., Atragene japonica Thunb., Eriocapitella japonica (Thunb.) Nakai
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ranunculaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	od Yunnanu a Sichuanu po Taiwan

Zařazení

Fytocenologický původ	Horské travnaté svahy a břehy potoků od 400-2600 m n.m.,
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsy velkých řapíkatých listů, v květu 60 - 120 cm vysoké (dle odrůd)
Kořen	vyrůstající z dřevnatějících oddenků
Výhony	vzpřímené, olistěné, bohatě vidličnatě větvené
Listy	přízemní listy dlouze řapíkaté v růžici, pýřité, zpravidla třídlíné s nedělenými středními laloky, vyrůstají z větvených oddenků; lístky zubaté, krátce stopečkaté
Květenství	postupně nakvétající bohatá lata
Květy	obvykle pětičetné (kulturní odrůdy též s více sepaly), růžové nebo bílé,cca 5-6 cm velké
Plody	hustě vlnatě pýřitá nažka
Vytrvalost	choulostivá k nízkým teplotám
Dlouhověkost	nespolehlivá vzhledem k možnému namrzání

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	dle odrůd

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na plném slunci vyžaduje dostatečné zásobení vodou
Faktor tepla	vhodná pouze pro teplé oblasti našeho státu, i zde často hrozí vymrznutí; na zimu vhodná ochrana - chvojí, listí apod.
Faktor vody	upřednostňuje svěží, vlhké půdy
Faktor půdy	živná, humózní, hluboká půda

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Doporučený spon pro výsad..	3 - 5 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Odrůdy	jednoduché - 'Praecox', 'September Charm', 'Splendens' (všechny růžové) nebo poloplné až plné - 'Prinz Heinrich'. Mnoho odrůd hybridního původu pod označením Anemone x hybrida nebo pod nekorektním zahradnickým označením Anemone japonica Hort. (vzniklo z var. Anemone hupehensis var. japonica za přičinění zahradníků). K významným hybridním odrůdám patří např.: růžově kvetoucí 'Hadsphen Abundance', 'September Charm' (jedn.), 'Königin Charlotte', 'Pamina' (poloplná); bíle kvetoucí 'Honorine Jobert', 'Whirbelwind' a jiné. V současnosti je takox přearzen do rodu Eriocapitella (Eriocapitella hupehensis (Lemoine) Christenh. & Byng, Eriocapitella x hybrida (L.H.Bailey) Christenh. & Byng)

Ostatní

Odkazy

- Hertle, B.: Reichblühende und vitale Herbst-Anemonen. In:

Garten praxis 12/2006, str. 9-15 Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.

- White floowered Japanese anemones. In: Plantsman (New Series), The. London: Royal Horticultural Society, 2014. ročník13, číslo 9 s. 188 -194. ISSN 0352-4186.
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/257>
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/68>

Grafické přílohy



