

Taxon Erigeron

Název taxonu	Erigeron
Vědecký název taxonu	Erigeron
Jména autorů, kteří taxon p...	Candolle
Odrůda	‘Mrs E.H. Beale’
Český název	turan ozdobný
Synonyma (zahradnický pou..	Erigeron macranthus Nutt.
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Erigeron

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	západní část Severní Ameriky podél Skalistých hor z Alberty až do severního Mexika

Zařazení

Fytocenologický původ	severoamerické prémie, okraje a světlé podrosty borových lesů
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí 30-60 cm vysoká trvalka tvořící úhlední trsy
Výhony	vzpřímené, pevné, lysé až jemně chlupaté 50-80 cm dlouhé, tupě hranaté
Listy	v přízemní růžici řapíkaté, obkopynaté, 5-8 x 0,5-2 cm velké, bazální střídavé, úzce kopinaté, přisedlé ouškatou bází, lysé nebo chlupaté, sytě zelené, na okraji jemně chlupaté až brvitě
Květenství	úbor cca 3 cm v průměru
Květy	zákrovní listeny ve 3 řadách, jazykovité květy velmi úzké (kolem 1 mm) namodralé, vzácně bílé, trubkovité květy žluté. V pěstovaných odrůdách barev bílá a různé odstíny růžové, karmínové, fialové
Plody	nažka s chmýrem
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	remontace záleží od odrůdy - některé remontují lépe jiné hůře

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	ve vegetaci vyšší nároky na vodu - upřednostňuje vlhké půdy, suché toleruje, ale rostliny jsou slabé, malé, nedostatečně vyvinuté, často trpí padlím
Faktor půdy	hlubší, živná, propustná zahradní půda s vyšším obsahem organických komponentů

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	velmi cenná také jako řezaná květina (komerčně pěstovaná) s dlouhou dobou kvetení a dlouhou trvanlivostí
Použití	nenáročná, oblíbená trvalka zahrad a předzahrádek, také ve veřejné zeleni a k řezu
Choroby a škůdci	padlí
Růstové i jiné druhově spec..	některé odrůdy se vyznačují slabší pevností lodyh, trsy se rozklesávají a tudíž vyžadují oporu (např. 'Dignity', 'Sincerity')
Doporučený spon pro výsad..	9 ks/m ²

Množení

Množení	Řízkování a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením starších trsů na jaře - malý koeficient množení; školkaři spíše řízkováním
Odrůdy	vdle starších odrůd selektovaných od <i>Erigeron speciosus</i> (např. 'Quakeress' - růžová, silně rostoucí, 'Roseus', 'Semiplenus') jsou v pěstování spíše odrůdy hybridního původu označované jako <i>Erigeron x cultorum</i> (zahradníky také často uváděny jako <i>E. hybridum</i> na nichž se vedle <i>E. speciosus</i> podílejí <i>E. glabellus</i> a <i>E. eximius</i>) s modrofialovými květenstvími ('Adria', 'Dunkelste Aller', 'Strahlenmeer', nejtmavší 'Dominator'), růžovými ('Rosa Triumph', 'Rosa Juwel'), karmínově červenými ('Karminstrahl', 'Rotes Meer'), bílými ('Schneewittchen', 'Sommernesuchnee') a jiné

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... XI/2018: 'Dunkelste Aller', Sommerneuschnee'; IX/2019: 'Mrs. E. H. Beale'

Dodavatel 'Dunkelste Aller', Sommerneuschnee'? Zámecké zahradnictví Ctěnice; 'Mrs. E. H. Beale': Stauden Stade (SRN)

Odkazy

- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/409>
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/410>

Grafické přílohy



