

Taxon Malus domestica ´Oldenburgovo červené

Název taxonu	Malus domestica ´Oldenburgovo červené´
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	´Oldenburgovo červené´
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	´Geheimrat Oldenburg´, ´Geheimrat Dr. Oldenburg´, ´Oldenburg´
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Německo, Geisenheim, Vinařská, ovocnářská a zahradnická stanice
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	ozářením roubů odrůd ´Hammersteinovo´ x ´Baumannova reneta´
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna vyšší, kulovitá, mírně převislá, nepravidelná, obvykle jednostranně vybíhají
Pupeny	listové pupeny jsou široké, tupě oválné, přitisklé, květní pupeny jsou střední až velké, oválné, mírně zašpičatělé
Listy	středně velké až větší, široce vejčité, tuhé, tlusté, světle zelené, pololesklé
Květy	středně velké, talířovité, téměř ploché, korunní plátky eliptické, nestejnomyrné, narůžovělé, zesponu načervenalé; dobrý opylovač, vhodné opylovači jsou odrůdy ´Coxova reneta´, ´James Grieve´, ´Starkrimson´, ´Spartan´, ´Průsvitné letní´, ´Mac Intosh´, ´Matčino´, ´Ontario´, ´Wealthy´
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (120-140 g), kulovité až kuželovité, souměrné, velmi vyrovnané, tmavě rozmytě červené, dužnina je bělavě nažloutlá, křehká, středně zrnitá, středně šťavnatá, nakyslejší, svěží, málo aromatická
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, barva a tvar výhonů, tvar a barva plodů, masná slupka.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, dlouhá, od 6. do 16. května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka polovina září (skladování do konce listopadu i déle), podzimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla středně mrazuodolná

Faktor půdy vhodná do vlhčích, úrodných a středně teplých stanovišť, střední až malé nároky na půdní i klimatické podmínky

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení méně jako čtvrtkmen, hlavně jako volné i vřetenovité zákrsky

Řez nutný přísný, hlubší výchovný řez

Podnož vhodné podnože M 11, M 1, A2, MM 106, M 7, M 4, M 2, M 9, popř. J-TE-E, J-TE-H

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci citlivá ke strupovitosti, ojediněle výskyt padlí

Růstové i jiné druhově spec.. v mládí středně bujný růst, v plné plodnosti slabý

Plodnost velmi raná (často začíná již ve školkách), vysoká a téměř pravidelná, 20-24 t/ha

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Velmi plodná a po vyšlechtění červené mutace i vzhledná odrůda vhodná do vlhčích, úrodných a středně teplých stanovišť jako tržní a zahrádkářská odrůda. Je nutná pečlivá ochrana proti strupovitosti.

Grafické přílohy

