

Taxon Cucurbita maxima

Název taxonu	Cucurbita maxima
Vědecký název taxonu	Cucurbita maxima
Jména autorů, kteří taxon p...	Duch.
Český název	tykev velkoplodá
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cucurbita

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Amerika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivý
Výhony	stonek válcovitý
Listy	ledvinovitý tvar
Květy	žlutá až oranžová koruna
Plody	kulovitý, ploše kulovitý, turbanovitý, různe ozdobné tvary, barva dužnin oranžová
Semena	bíla s okrajem, HTS 130 - 160 g
Vytrvalost	jednoletá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Září

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor půdy	humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí,

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>), antraknóza tykvovitých (<i>Colletotrichum lagenarium</i>), šedá hniloba, květilka všežravá (<i>Hylemyia platura</i>)

Množení

Množení Přímý výsev

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejblíže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)