

Taxon Cyanotis kewensis

Název taxonu	Cyanotis kewensis
Vědecký název taxonu	Cyanotis kewensis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Hasskarl) Clarke
Synonyma (zahradnicky pou..	Belosynapsis kewensis Hasskarl
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cyanotis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Indická oblast
Biogeografické regiony - po..	Indie

Zařazení

Fytocenologický původ	helorgadofyt, petrochtofyt - vlhké lesy a mokvavé skály od pobřeží k 1800 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - pozná..	poléhavá kobercovka (zimní zahrady, sesazované nádoby) nebo přepadavá hmkovka pro závěsné košíky, zelené stěny atd.
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivá (do 0.1 m výšky) nebo přepadavá kobercovka
Kořen	adventivní zpod nodů
Výhony	prorůstající ze zanikající listové růžice, poléhavé, větvené, purpurové, střídavě olistěné, přitiskle červenohnědě pýřité
Listy	v růžici spirálně seřazené, poté zhuštěně dvouřadé, masité, temně zelené, vespod purpurové, hrotnatě vejčité, přitiskle sametově pýřité
Květenství	rozvolněné brakteolátní vrcholíky s květy párovitě sdruženými
Květy	drobné, oboupohlavné, aktinomorfní, různobalné, volnoplátéčné, trojčetné, temně purpurové, diplostemonické s nápadně chlupatými tyčinkami a žlutými prašníky
Plody	tobolky
Semena	elipčitá s postranními zárodky
Možnost záměny taxonu (+..	zaměnitelná s blízkými druhy skupiny Belosynapsis: C. ciliata (Blume) Bakh. (květy v brakteálních květenstvích, listy lysé s brvitými okraji) nebo C. kawakamii Hayata (listy hedvábitě pýřité,

květy soliterní); druhy skupiny Cyanotis jsou zcela nepodobné srostloplátečnými květy sevřenými v hřebenitě seskládaných listenech.

Dlouhověkost relativně krátkověká - rychle stárne, nutno zmlazovat

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Srpen

Konec doby kvetení Listopad

Doba kvetení - poznámka příležitostně kvete celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín ✓

Faktor světla - poznámka přizpůsobivá, ale kompaktní a sytě vybarvená jen za dobrého osvětlení (30-40 klux)

Faktor tepla produkce: 18°C-20°C množení, poté 16°C/12°C

Faktor vody náročná na nekolísavě dostupnou vláhu

Faktor půdy přizpůsobivá; produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci početné deuteromycety (Colletotrichum, Botrytis, Septoria, Alternaria, Cercospora) a rzi (Uromyces, Phakopsora), ze škůdců především štítenky (Pinnaspis) a háďátka rodů Meloidogyne a Aphelenchoides

Množení

Množení Řízkování a Vrcholové řízky

Množení - poznámka řízky po 8-12 přímo do 10 cm hrnků - 80-90 hrnků na m², po čtyřech týdnech rozestavění

Konečné hrnky 10 cm hrnky - rozestavění 40-50 hrnků na m²; také 18 cm závěsné košíky (15-25 řízků)

Doba kultivace v 10 cm hrnkách asi osm týdnů, v 18 cm koších až 14 týdnů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Odkazy

- Hunt D. (2011): *Cyanotis*. The European Garden Flora I (Alismataceae to Orchidaceae), 321. Cambridge University Press.

Grafické přílohy



