

Taxon Ficus lepriouri

Název taxonu	Ficus lepriouri
Vědecký název taxonu	Ficus lepriouri
Jména autorů, kteří taxon p...	Miquel (1867)
Český název	fíkovník trojúhlý
Synonyma (zahradnicky pou..	Ficus triangularis Warb., Ficus furcata Warb.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. intermedia Hutch.

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Konžsko-guinejská oblast
Biogeografické regiony - po..	Tropická západní Afrika ze Senegambie do Zaire a Angoly

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt - světliny v suchých lesích, často podél potoků do 1200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý strom stálezelený a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom nebo liána (škrtič?)
Výhony	letorosty tenké, lysé, sivé, střídavě olistěné
Listy	obvejčitě trojúhlé, často na vrcholu uťaté, lysé, vespod s vidlicovitě rozeklanou, purpurovou primární nervaturou; palisty pýřité, opadavé
Květenství	drobná, přisedlá, okrouhlá receptakula uzavírající květy, s vyniklými ostioly, zelenožlutá nebo načervenalá; často v úžlabních shlucích
Květy	drobné s načervenalými tepaly - samčí obvykle s jedinou tyčinkou, v sykoniu pouze s kvěry hálkovými
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	drobné ledvinité nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	proměnlivý taxon, blízký v sekci Galoglychia neméně polymorfním druhům F. craterostoma Mildbr.& Burret a F. lingua Warb. (F. buxifolia DeWild.) - oba s neopadavými, zevnitř bělavě pýřitými palisty a s listy v poměru k délce výrazně užšími; často také

	zaměňován s nepříbuzným <i>F. deltoidea</i> Jack., kompaktním epifytem se zalamovaným větvením a listy obvejčitě lopatkovitými s bledou primární nervaturou
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Prosinec
Doba kvetení - poznámka	kvete a plodí za dostatku světla, ochotněji po suché periodě

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	k nedostatku světla citlivější než jiné fíkusy: množení 16-32 klux, produkce 64-80 klux; k déleodobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 4.0 klux
Faktor tepla	20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C léto (za vyšší RVV i optimum teplot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody	RVV: produkce 80% a více, prodejní haly 60%-80%, v bytech obecně druhy sekce <i>Galoglychia</i> méně náročné na vzdušnou vlhkost
Faktor půdy	především vzdušný a propustný substrát; produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Choroby a škůdci	rzi (<i>Physopella</i> , <i>Cerotelium</i>) a početné deuteromycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Macrophoma</i> , <i>Diplodia</i> , <i>Septoria</i> , <i>Glomerella</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Pellicularia</i> , <i>Corynespora</i>); ze škůdců svilušky (<i>Eotetranychus</i> , <i>Aceria</i>), červci (<i>Planococcus</i> , <i>Ceroplastes</i> , <i>Paratachardina</i>), třásněnky (<i>Gynaikothrips</i>), molice (<i>Singhiella</i> , <i>Paraleyrodes</i>), bejlomorky (<i>Horidiplosis</i>), háďátka rodů <i>Pratylenchus</i> a <i>Aphelenchoides</i>
Doporučený spon pro výsad..	produkce: 6 cm množárenské hmký 128-160 /m ² ; v konečných 10 cm hmkách 36-48 /m ²

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	především vrcholové řízky s 3-5 listy - rychleji zakoření a rychleji

	rostou; soliterně do 6 cm sadbovačů
Mezihrnky	řízky - multipack nebo hrnky 6 cm, přehrnkování do konečných hrnků
Konečné hrnky	obvykle hrnky 10 (12) cm
Retardace	ne
Květní tvorba	exaktní data chybí; tvorbu receptakulí podporuje krátkodobé vyschnutí substrátu při zvýšené světelné intenzitě
Reakční doba	doposud neověřována
Doba kultivace	v 12 cm hrnkách v létě čtnáct - šestnáct týdnů, v zimě zhruba 20 týdnů
Odrůdy	stará odrůda 'Variegata' s listy bíle pestrými

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky	VBN 2010: 828 tis. prod.hrnků v kategorii "Ficus overig" (téměř 2.5 mil. eur), z toho téměř 44% Ficus lyrata, data pro ostatní druhy sekce Galoglychia nedostupná. -- VBN 2005: "Ficus overig" 860 tis. hrnků, z toho 42 tis. rostlin Ficus natalensis (152000 eur) a 30 tis. Ficus lingua (VBN 1990: jen 16 tis. F. natalensis a 1 tis.hrnků F. Lingua)
Poznámka	Ficus leprieuri bývá dnes často redukován na poddruh jihoafrického Ficus natalensis Hochstt.
Odkazy	• Lebrun J., Boutique R. (1948): Ficus L. Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, Bruxelles; Rijn B.G.M., Hetterschied W.L.A., Likkien V.P.A. (1988): Sortiment Ficus onder de loep. Vakblad voor de Bloemisterij (91) 49: 37- 48; Stahn B.& al. (1987): Grünp

Grafické přílohy



