

Taxon Cornus sanguinea

Název taxonu	Cornus sanguinea
Vědecký název taxonu	Swida sanguinea
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	svída obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Swida sanguinea (L.) Opiz
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Malá Asie, Kurdistan

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř, vzácněji strom
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	asi 2–4 m vysoký keř s metlovitě vystoupavými větvemi nebo vzácněji strom až 7 m vysoký s kmínkem až 15 cm tlustým
Výhony	letorosty leskle červené nebo hnědočervené, zvláště v zimě nápadné, mladé výhony ale zelené
Pupeny	vstříčné
Listy	listy vstříčné, vejčité, vejčitě eliptické, oválné až eliptické, 3–10 dlouhé, líc světle až tmavě zelený, rub matně zelený a odstále chlupatý, báze zaoblená, 3–5 párů žilek, řapíky 6–18 mm dlouhé, na podzim jsou listy nachově červené
Květenství	květy ve 4–8 cm širokých vrcholcích se stopkami 25–35 mm dlouhými na konci větévek
Květy	květy krémově bílé či špinavě bílé, stopky květů asi 6 mm dlouhé
Plody	plody (zploštěle) kulovité, 5–8 mm dlouhé, černomodré se světlými tečkami, hořké a nechutné, nikoliv jedovaté, vytrvávají na keřích až do zimy

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	velmi otužilý, plastický druh
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ, podzimní barvič, zima - efekt barvy výhonů
Použití	podrost, tvarování, živé ploty, efekt podzimního zbarvení a zimního dřeva, násypy silnic, meliorační dřevina, rozptýlená vegetace

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky a Očkování
Množení - poznámka	nejčastěji množení letními či zimními řízky, popř. semeny, lze též očkovat na druhy příbuzné
Odrůdy	Arctic Fire' - výška asi 90–120 cm, kompaktní a menší než většina ostatních kultivarů, kmínky tmavě červené, 'Beteramsii' - široké keře, až 2 m, výhony v zimě žluté, osluněná strana oranžovočervená, 'Viridissima' - výhony a plody zelené