

Taxon Hoya lanceolata subsp bella

Název taxonu	Hoya lanceolata subsp bella
Vědecký název taxonu	Hoya lanceolata
Jména autorů, kteří taxon p...	Lindley in Donn (1825)
Český název	voskovka malá
Synonyma (zahradnicky pou..	Hoya bella Hook.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	subsp. bella (Hook.) D.H. Kent (1981)
Nadřazená kategorie	Hoya

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	Dolní Barma (Myanmar): Tenasserim

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	rozložitý keř, až 45 cm vysoký; tíhou listů a květů se výhony sklánějí a přepadají přes okraj nádoby
Výhony	tenké a rozložené, previslý charakter růstu; pýřité až hustě pýřité
Listy	vstřícné; kopinaté nebo vejčitě kopinaté, dlouhé do 3 cm, dužnaté, špičaté, báze zaoblená; světle zelené; krátce řapíkatý s vtaženou hlavní žilkou; okraje listů podvinuté, na rubu plstnaté
Květenství	ploše okoličnaté, vyrůstající z úžlabí listů; 8-12 paprsčitě souměrných květů;
Květy	voskově bílé, až 1,5 cm široké, ve středu růžové až purpurově červené, velmi sladce vonné, korunní cípy až 7 mm
Plody	měchýřek

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	v létě ne na plném slunci
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; v létě 18-20 °C; v zimě minimálně 15 °C
Faktor vody	udržovat rovnoměrnou mírnou vlhkost substrátu, rosení.
Faktor půdy	propustný humózní substrát s přídavkem zahradní zeminy; pH 5,8 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	duben až září
Použití	rostliny pro světlé interiéry do závěsných nádob a okraje sesazovaných nádob
Choroby a škůdci	vlnatky, puklice, svilušky; při přemokření hniloba kořenů

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	na jaře vrcholovými nebo stonkovými řízky ve vytápěné množárně, teplota substrátu 20-25 °C, zakořeňují za 6-8 týdnů; 3-5 ks na květináč

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/2601471?tab=chromosomecounts
--------	---