

Taxon Brassica napus var. napobrassica

Název taxonu	Brassica napus var. napobrassica
Vědecký název taxonu	Brassica napus var. napobrassica
Jména autorů, kteří taxon p...	L. Rchb.
Český název	tuřín
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. napobrassica
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro kořen

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytváří přizemní listovou růžici
Kořen	kulovitá nebo podlouhlá bulva bílé, žluté, nafialovělé barvy
Květenství	květní lodyha 2 m vysoká
Plody	šešule
Semena	HTS 2,8 - 3,8 g
Vytrvalost	dvouletý

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	vykete za 40 dní po výsadbě bulev
-------------------------	-----------------------------------

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Listopad

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	nenáročný na sluneční svit
Faktor tepla	nenáročný na teplotu

Faktor vody	nenáročný na vodu
Faktor půdy	mělké i hlubší půdy, bramborářská oblast

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika květáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), virová mozaika vodnice (Turnip mosaic virus - TuMV), další choroby jako u košťálové zeleniny
Doporučený spon pro výsad..	0,5 - 0,75 x 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)