Taxon Rhipsalis baccifera

Název taxonu	Rhipsalis baccifera
Vědecký název taxonu	Rhipsalis.baccifera
Jména autorů, kteří taxon p...	(Mueller) Stearn (1939; 1771 jako...
Český název	v praxi nepoužívané (věšák bobulonosný)
Synonyma (zahradnicky pou..	Rhipsalis cassytha Gaertn., Rhipsalis coralloides Rauh
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	subsp. baccifera

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a oblast temperátních jihoamerických lesů
Biogeografické regiony - po..	z mexického jihu (Oaxaca, Veracruz, Chiapas) přes karibskou šíji, antillské souostroví a amazonskou nížinu k brazilskému východu (Maranhao, Ceará, Pernambuco, Bahia)

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt - stálezelené i opadavé lesy a savany formací amazonica, cerradao a mata atlântica, z nížiny k 2400 m n.m. v horách
Pěstitelská skupina	Liána a Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - pozná..	epifytický kaktus okrasný listem a plodem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	akrotonicky větvený epifyt s tenkými, článkovanými, až dva metry dlouhými visícími stonky
Kořen	příležitostně vzdušné kořeny v místech větvení
Výhony	vidlanovitě až přeslenitě větvené s nejnižšími články až půl metru dlouhými, následované kratšími; cylindrické a poměrně tenké, svěže zelené, téměř lysé (s roztroušenými, sotva patrnými šupinkami s nevýraznými bělavými štětinkami v paždí)
Listy	přeměněny v nepatrné šupinky a štětinky na areolách
Květenství	květy vyvíjeny ze složených areol na koncích terminálních článků
Květy	oboupohlavné, hvězdicovité, neveliké, jen s 4-6 prosvítavě bělavými tepaly a nepříliš početnými bílými tyčinkami na spodních semenících s trojramennou bliznou
Opylovací poměry	Samosprašná

Plody	okrouhlé, průsvitně bílé nebo růžově naběhlé bobule velikosti hrachu, s lepkavou slizovitou dužninou
Semena	drobná, leskle hnědočerná
Možnost záměny taxonu (+..	zaměnitelná hlavně s jinými drobnokvětými druhy typového podrodu: R. teres Steud. (známější jako R.prismatica Rümpl.) nebo R.capilliformis Web. s květy a plody po stranách stonků (poslední s nápadně tenkými stonky); větší květy s 8-15 tepaly mají R.clavata Web. (bez dlouhých výběžků), R.cereuscula Haw. (se stonky drobně a hustě štětinkatými) nebo R. cribrata (Lem.) N.E.Br. (stonky nitkovité, bobule červené)
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	v domovině kvete v průběhu deštivého období

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	optimum 32-48 klux, toleruje 64 klux a více, k dlouhodobému udržení kvality v bytech 1-2 klux
Faktor tepla	množení 22°C-26°C, poté dle dostupnosti světla 18°C-24°C/18°C
Faktor vody	mesofyt, stejnoměrná vlhkost substrátu, toleruje občasné vyschnutí
Faktor půdy	produkce zpravidla v baltské rašelině s borkou, perlitem, pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	bakterie (Erwinia, Xanthomonas), rzi (Uromyces) a početné deuteromycety (Colletotrichum,Ceratocystis, Rhizoctonia, Sclerotia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrothecium, Pythium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), štítenky (Pinnaspis)

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Konečné hrnky	9 cm, 13 cm, 17 cm, 21 cm hrnky nebo závěsné košíky dle velikosti dopěstovaného produktu

Retardace	ne
Květní tvorba	pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, pro produkci nicméně nevýznamná
Doba kultivace	ve 13-14 cm hrnkách z vrcholových řízků 12-14 měsíců

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník

Ostatní

VBN statistiky	2010: roční obrat 2.8 mil.eur (Rhisalis, 2.2 mil.prod.hrnků) - ve VBN statistikách 75.příčka hrnkových květin; 2005 prakticky stejný obrat, z toho R.pilocarpa 76 tis.prod.hrnků (129 tis.eur)
Poznámka	AGM 2002
Odkazy	

- Lombardi J.A. (1995): O genero Rhipsalis Gärtner (Cactaceae) no estado de Sao Paulo. i. Especies com ramos cilindricos. Acta Botanica Brasilica 5(2): 53-76 -- Taylor N., Zappi D. (2004): Cacti of Eastern Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew.

Grafické přílohy