

Taxon Ammi majus

Název taxonu	Ammi majus
Vědecký název taxonu	Ammi majus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	morač větší
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ammi

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
------------------------	--------------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Pěstitelská skupina - pozná..	rod Ammi L. je zastoupen 6 druhy, druh Ammi majus na první pohled nezapře příbuznost s mnohými u nás rostoucími druhy z čeledi miříkovitých, i když jeho původ musíme hledat ve Středomoří, u nás se vyskytuje pouze na ojedinělých lokalitách jako zavlečený
Životní forma	Terofyt
Zařazení podle původu, nár...	letnička z přímého výsevu,

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tato pravá letnička, je-li pěstovaná, dosahuje výšky kolem 80–120 cm a je charakteristická velmi lehkou vzdušnou stavbou; k tomu přispívají jak dvakrát až třikrát peřenosečné listy s jemnými niťovitými úkrojky, tak velmi vzdušné okolíky, složené z mnoha malých okolíčků bílé barvy, okolíky bílé barvy jsou nesené na dlouhých stopkách a dorůstají průměru 10–15 cm, plod podobný kmínu.
Listy	peřenosečné listy s jemnými niťovitými úkrojky
Květenství	okolyčnaté bílé květenství
Květy	jednotlivé květy bílé drobné
Plody	plodem je dvounažka
Vytrvalost	není vytrvalá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen

Doba kvetení - poznámka	doba kvetení je závislá na mnoha faktorech, termínu výsevu, zálivce, obsah živin v půdě
-------------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Užitné vlastnosti

Použití	pestré záhony z přímého výsevu, řez (i komerčně na burzách), sušení, v léčitelství (plod)
Růstové i jiné druhově spec..	morač nepotřebuje předpěstování, vyséváme ho přímo na stanoviště v průběhu měsíce dubna, v teplejších oblastech našeho státu lze i na podzim, semena při klíčení vyžadují nižší teploty (neměly by přesáhnout 10 °C), proto je brzký výsev předpokladem úspěšného pěstování, pokud se spokojíme s menší kvalitou rostlin, můžeme vysévat až do července, je-li výsev příliš hustý, je vhodné semenáče po vzejití vyjednotit, u citlivých osob zejména v době květu rostliny a za vlhka, například za rosy, může dojít k vážnému podráždění pokožky až ke kožním zánětům a zpuchýřování, jde o fotodermatózní projev způsobený furokumariny, které jsou obsaženy ve všech částech rostliny, nejvíce v plodech

Množení

Množení	Přímý výsev
---------	-------------