

Taxon *Prunus avium* 'Rychlice německá'

Název taxonu	<i>Prunus avium</i> 'Rychlice německá'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus avium</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Rychlice německá'
Český název	třešeň ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Cerasus avium</i> , 'Raná z Marky', 'Nejranější z kraje', 'Májovka', 'Küpperova raná', 'Früheste der Mark', 'Küppers Frühkirsche'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Zařazení

Fytocenologický původ	údajně vypěstována ze semene, dle jiné zprávy se tato odrůda dostala za francouzsko-německé války v letech 1870-1872 z Francie do Gubenu
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	jehlancovitá, řídká koruna
Listy	středně velké, opakvejitě i eliptické, zelené, pololesklé
Květy	velké (průměr 32 mm), nejčastěji po 3, ale i 4 květech v květenství, korunní plátky bílé, mělce miskovité, blizna v úrovni prašníků, dobrý opylovač, vhodnými opylovači je 'Napoleonova'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	malé (3,5 g), srdčité až kulovité, tmavočervené, lesklé, dužnina šťavnatá, navinule sladká, velmi dobrá, barví
Možnost záměny taxonu (+..	Koruna, doba zrání, znaky a vlastnosti plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, průměrně od 17.4. do 25.4.
-------------------------	----------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec května až začátek června, 1. třešňový týden
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vyžaduje teplé oblasti
Faktor vody	ve vlhkých oblastech stromy značně trpí klejotokem

Faktor půdy nejlépe lehčí hlinité až hlinitopísčité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	polokmen, čtvrtkmen či zákrsek
Řez	základní výchovný řez a občasný průklest, jinak nenáročná
Podnož	ptáčnice, Colt, P-HL-A, P-HL-B

Užitné vlastnosti

Použití	především přímý konzum
Choroby a škůdci	odolná proti monilióze, netrpí vrtulí třešňovou díky své ranosti
Růstové i jiné druhově spec..	v mládí růst bujný, v plné plodnosti střední
Plodnost	velmi raná, hojná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba třešní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Vzhledem k uvedeným vlastnostem má význam jen pro svou ranost, a to především u drobných pěstitelů v kombinovaných výsadbách.
----------	---

Grafické přílohy

