

Taxon Ammobium alatum

Název taxonu	Ammobium alatum
Vědecký název taxonu	Ammobium alatum
Jména autorů, kteří taxon p...	Brown, Robert
Český název	pískožil křídlatý, slaměnka křídlatá, „písečná slaměnka"
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ammobium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Australská květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Austrálie, v Evropě v pěstování od počátku 19. století

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nepravidelně větvené bylinné keřky dorůstající výšky 60-80 (výjimečně až 100) cm, lodyhy jsou pevné, neolistěné, pokroucené a široce křídlaté; u starších rostlin se rozklesávají a poléhají, listy jsou v přízemní růžici, celokrajné, podlouhle kopinaté a na okrajích zvlněné, na rubové straně bíle plstnaté
Květenství	je úbor o průměru 1-1,5 cm, terč je tvořen drobnými žlutými trubkovitými květy, které postupně hnědnou až černají, na okraji úboru jsou 3 řady bílých trubkovitých květů s hedvábně lesklými listeny, po seřezání stonků s květenstvími mohou rostliny remontovat
Plody	nažka
Semena	semena jsou drobná, tyčinkovitého tvaru

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	VII – X, květenství kvetou dlouho, zničí je až mráz.
Remontování	✓

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor půdy výsev konec III až IV, výsadba na stanoviště v V, spon 0,3-0,4 m od sebe, možný je rovněž přímý výsev na jaře v 1g je 1500 semen, klíčivost 2 roky

Faktor půdy - poznámka písčité lehké půdy, suché a záhřevné stanoviště, na velmi humózních půdách bohatě roste, ale nekvete

Užitné vlastnosti

Použití pestré letničkové záhony, záhony z přímých výsevů do přírodních partií zahrad, rostlina na řez a na sušení, rostliny nutno sklízet ve stádiu poupat a nepříliš vyvinutých květů až do doby, kdy žluté trubkovité květy ve středech začínají černat, tomu lze zabránit šířením

Množení

Množení Předpěstování sadby

Odrůdy 'Grandiflorum flore pleno' (výška 60-80 cm); 'Bikiny' (květ v průměru 2 cm velký a stonek vysoký 30-40 cm; tuhý a vzpřímený růst, květní lodyhy se nerozklesávají)