

Taxon Aesculus x carnea

Název taxonu	Aesculus x carnea
Vědecký název taxonu	Aesculus x carnea
Jména autorů, kteří taxon p...	Hayne
Český název	jírovec červený, jírovec plet'ový
Synonyma (zahradnický pou..	Aesculus hippocastanum x Aesculus pavia; Aesculus rubicunda, Aesculus intermedia
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aesculus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	kulturní kříženec nalezený v roce 1818
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom až 20 m vysoký, koruna vejčitá
Výhony	hnědavě šedé, lysé
Pupeny	pupeny velké, jen slabě lepkavé
Listy	5-ti četné, lístky 8-15 cm tmavě zelené, lesklé, hladké, bez stopeček, 2x tupě pilovité
Květenství	jehlancovité vzpřímené laty, dlouhé 20–30 cm
Květy	červené, korunní lístky na okraji žláznaté a odstále chlupaté
Plody	řídce ositnité kulovité tobočky, 3-4 cm v průměru, plodí zřídka
Kůra a borka	v mládí tmavošedá hladká kůra, ve stáří hnědočerná šupinatá borka
Možnost záměny taxonu (+..	Aesculus hippocastanum (listy živě zelené, 7-mi četné, květy bílé)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilné stromy, mladší snesou i stín
Faktor světla - slunce	✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	uspokojivě mrazuvzdorné, oblasti I-III
Faktor vody	bez vodních extrémů, při vyšší vlhkosti namrzají
Faktor půdy	vyžaduje hlubokou, středně živnou a ne příliš mokrou půdu

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období květu
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	doplňková dřevina vhodná do měst, aleje, exponovaná místa
Růstové i jiné druhově spec..	výrazné růžově červené květy, tmavě zelené olistění, kompaktní tvar koruny

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Očkování a Očkování - Na bdící očko
Množení - poznámka	očkujeme na kořenový krček semenáčů A. hippocastanum, méně častěji výsevem, očkovat lze i rouby s terminálním pupenem
Odrůdy	‘Aurea’ - listy žlutě panašované, ‘Briotii’ - květy tmavě červené, nejčastěji pěstovaný kultivar, ‘Pendula’ - větve dlouze převislé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)